

AXI

動物藥製字 第07161號

動物用注射劑 (滅菌懸劑)

“永鴻”安莫西林長效注射液

Amoxicillin L.A. Injection

“永鴻”安莫西林長效注射液主成分Amoxicillin是一種半合成的廣效Penicillin製劑，對於革蘭氏陽性菌及陰性菌均有強力的殺菌作用。故本藥可用來治療由Amoxicillin敏感性菌所引起之家畜感染疾病。

【成份】每毫升(mL)含有 Amoxicillin Trihydrate 150mg (Potency)

【特點】

1. 本藥係一廣效性、殺菌性的抗生素，作用迅速確實，對革蘭氏陽性菌、陰性菌均有強力殺菌作用。
2. 本藥投與後能充分有效的分佈於喀痰、尿液、膽汁等各組織中，故對於上下呼吸道、泌尿生殖道、腸胃道、皮膚及其它感染症確實有優異的效果。
3. 本藥除了具備以上各特性外，同時毒性非常低，性質安定，所以非常適用於各種細菌性感染症。

【適應症】

牛、豬：治療對Amoxicillin敏感之細菌引起的感染，及革蘭氏陽性菌和巴氏桿菌引起的呼吸道感染。

【用法用量】

肌肉注射：使用前請搖勻

一般劑量：每公斤體重注射15毫克，相當於每10公斤體重注射本品1ml。如有需要，48小時後可再注射乙次。

【禁忌】

請勿用於已知對β-內醯胺類藥物過敏的藥物。

請勿用於兔子、天竺鼠、倉鼠或沙鼠。

已知對Amoxicillin具抗藥性時，不適用本產品。

請勿用於患有嚴重腎功能不全及伴隨無尿和少尿的動物。

【預防措施】

動物使用時之特殊注意事項：本產品使用不當，可能會增加細菌對Amoxicillin的抗藥性盛行率，且可能會降低其療效。每一個注射部位勿施打超過20毫升。

獸醫師應採取的特殊預防措施：盤尼西林和頭孢菌素可能會在注射、吸入、經口或皮膚接觸後引起過敏反應(過敏)。此種盤尼西林的過敏反應可能會與頭孢菌素交叉反應，反之亦然。有時候這些過敏反應可能會非常嚴重。如果您曾經對此類分子敏感或經建議應避免接觸此類分子時，請勿操作本產品。如果皮膚或眼睛意外接觸時，請立即使用大量清水沖洗。如果接觸後出現症狀(皮膚發紅)時，請立即就醫，並向醫生出示通知。臉部、嘴唇或眼睛腫大或呼吸問題，皆為需要緊急醫療的嚴重病徵。

【不良反應】

盤尼西林和頭孢菌素可能會在給藥後引起過敏。有時候這些物質引起的過敏反應可能會很嚴重(全身性過敏反應)。

【懷孕、哺乳或生產期間使用】

目前尚無針對懷孕期間之適用動物進行的安全性評估。是否讓懷孕的雌性動物使用本藥物，可由獸醫師依據風險/效益比的評估結果決定。

【注意事項】

1. 使用前請搖勻。
2. 停藥期：牛-肉、內臟18天、牛奶3天
豬-肉、內臟：10天
3. 請在有效期限內使用。
4. 儲存於陰涼乾燥的地方，避免陽光直接照射及孩童接觸。

本處方藥品限由執業獸醫師(佐)監督之下使用

【包裝規格】10, 20, 50, 100毫升瓶裝

產品批號、製造日期及有效日期請見瓶身標示

本製造廠通過台灣檢驗科技股份有限公司(SGS Taiwan Ltd.) ISO 9001認證



永鴻國際生技股份有限公司

VETNOSTRUM ANIMAL HEALTH CO., LTD.

台北市松山區民權東路三段181號12樓 | 02-2718-6200

新竹廠：新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號

產品編號：432008010

217515543

