

咳龍®系列 全產品

咳龍® 20% 散

成分

Tiamulin Hydrogen Fumarate 200mg

適應症

豬 - 傳染性肺炎、豬赤痢。
雞 - 慢性呼吸道疾病、傳染性鼻竇炎。

用法用量

每噸飼料中添加本藥之用量如下：

豬 - 赤痢0.3-0.5公斤，連用3-6天。流行性肺炎為1公斤，連用5-7天。

雞(不含產蛋中之蛋雞) - 治療2-2.5公斤，連用3-5天。

停藥期：7天。



CLP20

包裝：1kg
許可證號：07154

咳龍® 2.5% 注射液

成分

Tiamulin Hydrogen Fumarate 25mg

適應症

治療豬赤痢及傳染性肺炎

用法用量

本藥以每公斤體重計算：

豬 - 赤痢為0.25-0.5ml/kg體重，每日一次，連續治療不可超過7天。

停藥期：25天。



COI25

包裝：100ml
許可證號：08154

咳龍® 20% 注射液

成分

Tiamulin Hydrogen Fumarate 200mg

適應症

治療豬赤痢、綜合呼吸道疾病、黴漿菌關節炎

用法用量

肌肉注射：

治療豬赤痢 - 每20kg體重使用1ml一次。

治療豬綜合呼吸道疾病 - 每20kg體重使用1-1.5ml一次，連續治療3-5天。

治療黴漿菌關節炎 - 每20kg體重使用1-1.5ml一次，連續治療3天。

停藥期：14天。



COI20

包裝：100ml
許可證號：09271

注意事項

- ① 不得與離子型球蟲藥(Monensin, Narasin, Salinomycin)併用。
- ② 於25°C以下陰涼處儲存。
- ③ 本處方藥品限由執業獸醫師(佐)監督之下使用。



咳龍® 系列

劑型多 | 殺菌快 | 疫病除




截短側耳類抗生素之藥物動力學

咳龍系列 主要成分為 Tiamulin，又稱泰妙菌素，為截短側耳類抗生素，其藥理作用為抑制蛋白質合成，作用於細菌內之核糖體，對革蘭氏陽性菌、陰性菌、螺旋體屬等具有強力的抑菌效果，如：鏈球菌 (*Streptococcus spp.*)、巴氏德桿菌 (*Pasteurella spp.*) 及大腸桿菌 (*E. coli*) 都有良好抑制作用。

特別針對黴漿菌 (*Mycoplasma spp.*) 引發之疾病及豬赤痢螺旋體 (*Brachyspira hyodysenteriae*) 和 *Fusobacterium necrophorum* 等導致之症狀，具有優越的制菌效果。

咳龍系列 口服易吸收，約2-4小時就可達到血中最高濃度，組織穿透力強。

Tiamulin 以注射及口服之藥物動力學



注射濃度 - 兩小時內

達到最高抑菌濃度
(實際上一個小時內開始達到最小抑菌濃度的效果)

飼料/飲水 - 兩小時內

體內藥物濃度維持24小時以上的
抑菌濃度(穩定期)

咳龍系列 對呼吸道及消化道複合感染症具有明顯療效


針對呼吸道細菌問題

短時間內具有抑菌能力，
四小時內肺臟高濃度之抑菌效果，
效果持續24小時。

針對腸道細菌性問題

於腸道達到有效抑菌濃度，有效
清除赤痢相關問題。

咳龍注射液 之藥物動力學



咳龍系列 臨床應用-家禽



雞慢性呼吸道疾病 (Chronic respiratory disease;CCRD)

Mycoplasma gallisepticum


好發年齡：肉雞 - 4-8週齡之間

臨床症狀：咳嗽噴嚏，濕性囉音，鼻及眼睛分泌物。火雞可見眼窩下竇腫脹之症狀。
蛋雞可見產蛋率下降，粗殼蛋增加，普遍有消瘦症狀。

注意事項：因tiamulin會干擾monensin跟salinomycin的代謝，若這些藥物同時投與，會有毒性反應。
必須謹慎使用且避免管線污染。

咳龍系列 臨床應用-豬


呼吸道疾病-黴漿菌



肺炎黴漿菌 *Mycoplasma hyopneumoniae*

好發年齡：6週齡至上市年齡 (特別是2-4月齡)

臨床症狀：持續性乾咳和呼吸困難，並伴有肺炎，胃口好，生長速率變慢。



鼻炎黴漿菌 *Mycoplasma hyorhinis*

好發年齡：通常在3-10週齡

臨床症狀：急性包括中等程度的體溫升高，跛行，輕微食慾不振，
關節活動困難和腫脹。
呼吸困難，常以胸骨臥位為主要姿勢。



豬關節滑膜黴漿菌 *Mycoplasma hyosynoviae*

好發年齡：12-24週齡

臨床症狀：跛足，難以起身，偶有跪姿，站立狀態的豬隻容易隱藏關節腫大症狀。
在腫脹的關節內伴隨肌纖維蛋白滲出液。



豬黴漿菌症 *Mycoplasma suis*

好發年齡：全年齡

臨床症狀：仔豬會呈顯皮膚蒼白與貧血，母豬急性期會高燒厭食，慢性期衰弱
蒼白及黃疸症狀，嚴重時影響繁殖效益。

消化道細菌疾病 - 增生性迴腸炎及豬赤痢



慢性 - 增生性迴腸炎

好發年齡：2-5月齡

臨床症狀：糞便呈現棕色，糊狀或水狀，部分病豬皮膚呈現蒼白，
整批近10%瘦弱豬。



急性 - 增生性迴腸炎

好發年齡：4-12月齡

臨床症狀：糞便呈現正常或血痢，型態偏水狀，導致食慾減退，
虛弱且急性死亡豬隻體表蒼白。

咳龍[®] 2.5% 注射液

COI25
動物藥製字 第08154號

動物用注射劑 (注射劑)

CLON[®] 2.5% Injection

本藥係由Pleurotus mitilus培養所得Pleuromutilin的一種半合成衍化體之抗生素，其中以Tiamulin Hydrogen Fumarate的抗菌活性最優，取其主要成分而製成之2.5%注射液，本藥針對因Mycoplasmas spp.引起之豬傳染性肺炎與Serpulina spp.引起之赤痢症有治療效果。本藥亦對革蘭氏陽性菌如Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynebacterium pyogenes和陰性細菌如Pasteurella spp., Klebsiella pneumoniae, Actinobacillus (Haemophilus) spp., Fusobacterium necrophorum, Bacteroides spp., Campylobacter coli, Lawsonia intracellularis等皆有優秀的抗殺菌效力，為理想治療製劑。

【成份】每毫升(mL)含有：Tiamulin Hydrogen Fumarate 25mg

【特點】

1. 本藥對革蘭氏陽性菌、陰性菌、螺旋體屬等具有強力的殺菌效果。巴氏德桿菌(Pasteurella spp.)、志賀氏菌、葡萄球菌(Staphylococcus aureus)、鏈球菌(Staphylococcus agalactiae)及一些大腸桿菌都有良好抑制作用。
2. 本藥抗菌範圍廣泛，尤其對微漿菌性疾病具有優越的制菌殺菌之治療效果。
3. 本藥如單一使用即提供安全快速之藥效。

【適應症】

豬：治療豬赤痢症、豬傳染性肺炎(S.E.P)。

【用法用量】

本藥以每公斤體重計算行肌肉注射，治療豬赤痢症、豬傳染性肺炎，使用劑量0.25-0.5mL/kg b.w.，每日一次。連續治療不可超過7天。

【注意事項】

1. 勿與Polyether類離子型抗球蟲藥(Monesin、Narasin及Salinomycin Sodium)併用，以防毒性發生，而造成嚴重生長遲緩致死，其他的抗球蟲藥與化學治療劑皆可同時併用。
2. 應放置於兒童伸手不及之處。
3. 停藥期：25天。
4. 陰涼處儲存。
5. 請在有效期限內使用。

本處方藥品限由執業獸醫師(佐)監督之下使用

【本產品適應症、建議使用方式、禁忌症、警語、儲存條件及相關注意事項，請詳閱仿單內容】

【包裝規格】100毫升瓶裝

產品批號、製造日期及有效日期請見瓶身標示

本製造廠通過台灣檢驗科技股份有限公司(SGS Taiwan Ltd.) ISO 9001認證

 vetnostrum

永鴻國際生技股份有限公司
VETNOSTRUM ANIMAL HEALTH CO., LTD.
新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號 | 03-621-6688
產品編號：431019010(COI25) 217516143

