

# 賜來富<sup>®</sup> 滅菌懸浮液 5%

GRI5

動物藥製字 第08514號

動物用注射劑 (滅菌懸劑)

## Grantlife<sup>®</sup> Injection 5%

Ceftiofur Hydrochloride是一種新一代具廣效抗菌譜的頭孢子素類抗生素 (Cephalosporin antibiotic),其在獸醫學上,已被證實對許多革蘭氏陰性及陽性菌及具有betalactamase之細菌均具有非常優異的殺菌效果;Ceftiofur Hydrochloride治療豬、牛的呼吸道之細菌性肺炎疾病,具有優異的治療效果。

【成份】每毫升(mL)含有Ceftiofur .....50 mg (Potency)  
(相當於Ceftiofur Hydrochloride ..... 53.48 mg)

### 【特點】

1. 本藥是動物專用之新型廣效性抗生素,故殆無誘發耐性菌之虞。
2. 本藥抗菌範圍廣泛,對絕大多數的革蘭氏陽性及陰性細菌引起之混合感染症,具有優越的殺菌效果。
3. 本藥使用劑量少,作用強,且療效迅速。
4. 本藥毒性低、安全性高,殆無副作用。
5. 本藥可使用於泌乳期之乳牛,搾乳期無需停藥措施。

### 【適應症】

牛、豬 - 治療因胸膜炎放線桿菌及巴氏桿菌所引起之呼吸道疾病,由壞死性梭菌(*Fusobacterium necrophorum*)和黑色素生成菌(*Bacteroides melanogenicus*)所造成的蹄真皮炎,子宮炎和所有對Ceftiofur有感受性的細菌所引發的感染症。

### 【用法用量】

- 豬、牛-依每10公斤體重計算如下;  
牛:0.2~0.4 mL,行肌肉注射;  
豬:0.2~0.6 mL,行肌肉或皮下注射,  
以上每日注射一次,連續使用3天。

### 【注意事項】

1. 本藥為動物專用,請勿使用於人,並應置於兒童無法取得之處。
2. 避免與皮膚或黏膜接觸,以免引起過敏反應。
3. 本藥經開封後保存期限為二個月內。
4. 停藥期:肉豬為2天;肉牛為2天;乳牛:0天。
5. 使用前必需充份搖晃均勻。

本處方藥品限由執業獸醫師(佐)監督之下使用

### 【包裝規格】100毫升瓶裝

產品批號、製造日期及有效日期請見瓶身標示

本製造廠通過台灣檢驗科技股份有限公司(SGS Taiwan Ltd.) ISO 9001認證

 **Vetnostrum**

**永鴻國際生技股份有限公司**

VETNOSTRUM ANIMAL HEALTH CO., LTD.

台北市松山區民權東路三段181號12樓 | 02-2718-6200

新竹廠:新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號

產品編號: 432002010

217514942

# 賜來富®

乾粉注射劑 / 滅菌懸浮液



Grantlife® Injection

動物藥製字 第08514號  
動物藥製字 第08371號



## 產品優勢

抗菌效果廣

本藥為第三代頭孢子素抗生素，對革蘭氏陽性及陰性細菌引起之感染症，具殺菌效果。

停藥期短

滅菌懸浮注射液 乳汁0天，肉豬、肉牛2天。  
乾粉注射劑 5天。

用量少

作用強效，安全性高，無副作用。



滅菌懸浮注射液



乾粉注射劑

## 成分

**乾粉注射劑** - 每瓶含有 Ceftiofur Sodium ..... 4g  
**滅菌懸浮注射液** - 每ml含有 Ceftiofur ..... 50mg (Potency)

## 建議使用方法

品種	適應症	建議使用方法
牛、羊	治療呼吸道疾病(肺炎及運輸熱), 溶血性/敗血性巴斯德桿菌及嗜血桿菌之混合感染。	<b>乾粉注射劑</b> - 每公斤體重肌肉注射1.1-2.2mg。 每日一次,連續3天,視狀況嚴重性可增加1-2天療程。 <b>滅菌懸浮液</b> - 每10公斤體重肌肉注射0.2-0.4ml, 每日一次,連續使用3天。
豬	治療細菌性肺炎 (放線桿菌胸膜肺炎,嗜血桿菌, 巴斯德桿菌,沙門氏菌,鏈球菌)	<b>乾粉注射劑</b> - 每公斤體重肌肉注射3-5mg。 每日一次,連續3天。 <b>滅菌懸浮液</b> - 每10公斤體重肌肉或皮下注射0.2-0.6ml, 每日一次,連續使用3天。
一日齡 雞及火雞	治療大腸桿菌症。	<b>乾粉注射劑</b> - 一日齡雞: 每隻雞頸部皮下注射0.08-0.2mg。 一日齡火雞: 每隻火雞頸部皮下注射0.17-0.5mg。
犬	治療因大腸桿菌和 <i>Proteus Mirabilis</i> 引起的尿道感染症。	<b>乾粉注射劑</b> - 每公斤體重皮下注射5mg。 每日一次,連續5-14天。

## 包裝

**乾粉注射劑** - 100ml 稀釋瓶 (內含本藥粉劑4g)  
**滅菌懸浮液** - 100ml

## 注意事項

- 本處方藥品限由執業獸醫師(佐)監督之下使用。
- 本藥請於25°C以下,避光保存,滅菌懸浮液開封後請於兩個月內使用完畢。
- 對β-lactam類抗生素過敏時,避免使用本藥。
- 停藥期：**乾粉注射劑** - 5天。  
**滅菌懸浮注射液** - 肉豬:2天、肉牛:2天、泌乳牛:0天

