LNI3
動物藥製字 第05674號
動物用注射劑 (注射劑)

林可黴素 -300 注射液

Lincomycin -300 Injection

Lincomycin係由Streptomyces lincolnensis var. lincolnensis的培養液中所得到的抗生物質。對絕大多數常見的革蘭氏陽性細菌具有特異的效果，依細菌之敏感性及抗生素濃度之不同而呈殺菌性或制菌性作用，尤其是對青黴素類(Penicillins)或四環素類(Tetracyclines)已產生抗藥性的葡萄菌球屬(Staphylococci)等最為適切；且本藥雖與巨環類抗生素(如Erythromycin)同樣作用在細菌的核醣體(ribosome)以抑制其蛋白質的合成，但因其化學結構上之差異，使得兩者之間有相似但並不相同的抗菌作用。綜上所述，本藥對於感受性細菌所引起的各種感染症狀將發揮迅速而確實的治療效果。

【成 份】每毫升(mL)中含有：Lincomycin Hydrochloride..... 300mg (potency)

【特 點】

1. 本藥除了對於引起動物各種感染症的常見革蘭氏陽性菌於極低的濃度下就有卓越的效果外，對於某些類細菌(Bacteroid)、放射菌屬(Actinomyces)及黴漿菌(Mycoplasma)、原形蟲屬(Plasmodium)也具有相當戲劇化的效果。
2. 本藥對於禽畜呼吸道感染症具有理想的治療效果。
3. 本藥對於各種動物所患蜂窩組織炎、膿瘍及軟組織的化膿性感染，因多係革蘭氏陽性菌所致，故具有良好以至極優的功效。
4. 本藥作用時間長，並與常用的其他各種抗生素之間無交叉抗藥性，且細菌對本藥亦不易產生抗藥性，故抗菌效果確實。
5. 本藥少有過敏性反應，毒性低，故安全性高。

【適應症】

雞、火雞(不含產蛋中之蛋雞)、家畜：
各種革蘭氏陽性菌及其它具有感受性細菌所引起之感染症，如：肺炎、氣管炎、慢性呼吸器病、傳染性鼻炎、中耳炎、膿胸、腦膜炎、蜂窩組織炎、膿瘍、細菌性敗血症、放線菌症。

【用法用量】

按雞、火雞(不含產蛋中之蛋雞)、家畜每公斤體重使用10～20mg，依症狀增減之，每日一次施行肌肉注射或靜脈注射均可。

【注意事項】

1. 停藥期7天。
2. 雞16週齡以上不得使用，產蛋中之蛋雞不得使用。
3. 請在有效期限內使用。

本處方藥品限由執業獸醫師(佐)監督之下使用

【本產品適應症、建議使用方式、禁忌症、警語、儲存條件及相關注意事項，請詳閱仿單內容】

【包裝規格】10、20、50、100毫升瓶裝

產品批號、製造日期及有效日期請見瓶身標示

本製造廠通過台灣檢驗科技股份有限公司(SGS Taiwan Ltd.) ISO 9001認證

Vetnostrum
永鴻國際生技股份有限公司
VETNOSTRUM ANIMAL HEALTH CO., LTD.
新竹廠：新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號
產品編號：431023010 217515843