

# 多剋星® 長效注射液 20%

OXI  
動物藥製字 第08825號  
動物用注射劑 (注射劑)

## OKISI® LA Injection 20%

羧四環黴素(Oxytetracycline)為廣效性的抗生素，對於非耐酸性的革蘭氏陽性菌及革蘭氏陰性菌、黴菌、阿米巴原蟲、壁衣體菌、立克次體、鉤端螺旋體有良好治療效果。

### 【成份】每毫升(mL)中含有：

Oxytetracycline ..... 200 mg (potency)  
(as Oxytetracycline Hydrochloride ..... 216 mg)

### 【特點】

1. 羧四環黴素(Oxytetracycline)作用機轉為阻礙細菌蛋白質之合成。
2. 肌肉注射20 mg/kg 羧四環黴素(Oxytetracycline)在血中有效濃度可維持3-4天；最高血中濃度於注射後4-6小時達高峰。

### 【適應症】

- 牛、豬、羊：治療巴氏桿菌症、肺炎及胸膜炎、膿瘍、傷口感染且也能控制術後及產後之感染。  
豬：治療MMA（乳房炎及子宮炎無乳症綜合症）、丹毒症、子宮炎、臍帶炎、關節炎、豬萎縮性鼻炎。  
牛：治療放線桿菌病、犢白喉、腐蹄病、乳房炎、邊蟲病、心包積水症、角膜結膜炎。  
羊：治療腐蹄病、乳房炎、子宮炎、臍帶炎、關節炎、地方性流產。

### 【用法用量】

深部肌肉注射投藥。治療使用劑量每公斤體重使用 20 mg（相當於每10公斤體重使用本品1 mL），100公斤以上動物，最好劑量分半，分別注射兩個不同的部位。

### 【注意事項】

1. 本藥請在25°C以下避光儲存。
2. 本藥不適用於狗、貓、馬。
3. 停藥期：肉21天，牛奶7天（經14次擠乳）。
4. 請在有效期限內使用。

本處方藥品限由執業獸醫師(佐)監督之下使用

【本產品適應症、建議使用方式、禁忌症、警語、儲存條件及相關注意事項，請詳閱仿單內容】

【包裝規格】100、250、500毫升瓶裝

產品批號、製造日期及有效日期請見瓶身標示

本製造廠通過台灣檢驗科技股份有限公司(SGS Taiwan Ltd.) ISO 9001認證

vetnostrum

永鴻國際生技股份有限公司  
VETNOSTRUM ANIMAL HEALTH CO., LTD.  
台北市松山區民權東路三段181號12樓 | 02-2718-6200  
新竹廠：新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號  
產品編號：431024010 217516342



# 多剋星®

長效注射液 20%

## OKISI® LA Injection 20%

細菌感染剋星

多剋星®

繁殖相關疾病 - 乳房炎、子宮炎、無乳症綜合症

呼吸系統性疾病 - 肺炎、胸膜炎、鼻炎

骨關節病 - 腐蹄病、關節炎

產房常見感染 - 膿瘍、傷口感染、臍帶炎、  
術後及產後感染

## 一針長效 -

- ① 肌肉注射血中有效濃度可維持3-4天，效果持久，減少操作困擾。
- ② 廣效性抗生素，有效治療腐蹄病、關節炎、產後無乳症、術後、產後及流產等不明原因之感染。

### 多剋星®

### OKISI® LA Injection 20%

#### 成分

每毫升中含有Oxytetracycline 200mg (Potency)

#### 適應症

牛、豬、羊 - 治療巴氏桿菌症、肺炎及胸膜炎、膿瘍、傷口感染且也能控制術後及產後之感染。

豬 - 治療MMA(乳房炎及子宮炎無乳症綜合症)、丹毒、子宮炎、臍帶炎、關節炎、豬萎縮性鼻炎。

牛 - 治療放線桿菌病、犢白喉、腐蹄病、乳房炎、邊蟲病、心包積水症、角膜結膜炎。

羊 - 治療腐蹄病、乳房炎、子宮炎、臍帶炎、關節炎、地方性流產。

#### 用法用量

深部肌肉注射投藥：

治療使用劑量每公斤體重使用 20 mg (相當於每 10 公斤體重使用本品 1 ml)，100 公斤以上動物，最好劑量分半，分別注射兩個不同的部位。

體重-用量速算表

體重 (kg)	用量 (ml)	體重 (kg)	用量 (ml)
10	1	100	10
20	2	150	15
50	5	200	20
90	9	300	30

#### 注意事項

- 本處方藥品限由執業獸醫師(佐)監督之下使用。
- 本藥請在室溫25°C以下避光儲存。
- 本藥不適用於狗、貓及馬。
- 停藥期：肉21天，牛奶7天(經14次擠乳)

