

內分泌製劑 系列

HORMONE



給母豬全方位的照護

永齊孕[®] 口服液


依定生[®] 注射液

催生素 注射液

多情素[®] 懸浮注射液

 vetnostrum

內分泌製劑系列, 提供 母豬全方位的照護!



永齊孕®
口服液劑 產品

- 人工合成的助孕酮製劑 (Altrenogest)
- 女豬發情管理利器, 有效預測發情週期
- 豬群同期化發情, 集中管理, 減少差異
- 管控新女豬數量, 減少飼料消耗
- 優化生產流程, 提升牧場生產效能

針劑 產品

依定生®

分娩同期化
管理有規劃

- 人工合成的前列腺素製劑 (Cloprostenol)
- 有效溶解黃體, 誘導分娩, 使分娩同期化
- 大部分母豬於注射後約24 - 36小時開始分娩

催生素

收縮強有力
生產不費力

- 化學合成之催產素 (Oxytocin)
- 促進子宮平滑肌收縮, 產生調節作用及刺激乳腺收縮
- 作用快速且強力, 促使胎兒與胎盤排出


多情素®

母豬發情穩
配種不失準

- 促使母畜發情正常, 使發情徵候明顯, 提高配種成功率
- Chorionic Gonadotrophin 使濾泡成熟排卵, 促進黃體形成
- Estradiol Benzoate 促子宮內膜增生發育, 以利受精卵著床

永齊孕® 可使用在新女豬發情週期的任何階段

- ✓ 促使不同週期之新女豬/後備母豬發情同期化。
- ✓ 每天一次, 連續餵食18天, 讓豬群的生理狀態相近。
- ✓ 停止餵食後4-7天, 豬群進入發情期。



內分泌製劑



動物藥製字 第09502號

永齊孕® 口服液 Oestrufix® Oral solution

成分:每毫升含有Altrenogest 4mg

用法用量:每隻動物每天給予20mg之 Altrenogest (相當於本藥5毫升), 直接伴糧食用, 連續使用18天。

停藥期:9天。

- 注意事項:**
- ① 若重複性意外地接觸並吸收本藥, 會導致月經週期混亂、子宮或下腹部痙攣、增加或減少子宮出血, 懷孕時間延長或頭痛。
 - ② 若已知會對主成分過敏, 應避免接觸本產品。

依定生® 注射液 Regubirth® Injection

成分:每毫升含有Cloprostenol Sodium B.P. (Vet) 92µg (相當Cloprostenol 87.5µg)

用法用量:每頭母豬使用劑量為2ml, 以肌肉深部注射。

停藥期:注射本劑24小時內之母豬, 請勿屠宰供人食用。

- 注意事項:**
- ① 太早注射將使小豬早產無法育成, 即在平均分娩前3日(含)注射時, 可能增加不能育成之仔豬數。
 - ② 本藥可經由皮膚吸收, 具有生育年齡、懷孕婦女及氣喘病患者避免接觸, 因意外濺及皮膚時, 應立刻用清水洗乾淨。若因意外吸入或注射本劑引致呼吸困難時, 應使用速效型之支氣管擴張劑(如Isoprenaline 或 Salbutamol) 治療。



動物藥製字 第08334號

催生素 注射液 Kistocin® Injection

成分:每毫升含有Oxytocin 10 units

用法用量:行皮下或肌肉注射。

豬: 每次1-3ml。 牛、馬: 每次1-4ml。 犬: 每次0.2-1ml。 貓: 每次0.2-0.5ml。

(應在母畜的子宮頸管已擴張後才施打, 否則容易導致子宮破裂。)



動物藥製字 第07037號

多情素® 注射液 Lover® Injection

成分:每毫升含有Chorionic Gonadotrophin 250 units ; Estradiol Benzoate 1mg

用法用量:行皮下或是肌肉注射, 使用前請充分震盪混合藥液, 使成均一油質懸濁液。

母豬: 每次2ml/每頭。 母牛: 每次5ml/每頭。 母馬: 每次5-8ml/每頭。

(注射本藥3天內, 勿重複注射。)

停藥期:5天。

注意事項:請充分振搖藥液後使用。



動物藥製字 第06105號

RHI
動物藥製字 第08334號

動物用注射劑 (注射劑)

依定生®

Regubirth® Injection

本劑屬於前列腺素F_{2α}(Prostaglandin F_{2α}簡稱PGF_{2α})之一，其作用即使子宮平滑肌和輸卵管發生痙攣性收縮及蠕動異常，並壓縮子宮卵巢動脈，阻斷了黃體的血液，使黃體細胞呈飢餓狀態，而達到溶解黃體作用，助孕酮濃度也會急速下降，同時增強雌激素作用，使子宮腔內環境不利於著床，所以對懷孕早期能導致流產，對懷孕末期能運用為誘導生產。

現代化經營豬場如欲實施批次生產管理，改善種母豬生產力、增加年生產、出售及屠宰之豬隻頭數，在技術上，本劑可提供豬場針對有下列情況之母豬群施行注射：一、有永久黃體不再發情母豬，使黃體溶解，以期恢復發情週期再配種生產。二、懷孕種母豬適時著手定期分娩，提昇生產工作效率。

【成份】每毫升(mL)中含有：
Cloprostenol Sodium 92μg(相當Cloprostenol 87.5μg)

【特點】

1. 本劑用於定期分娩，有助豬場做批次生產計劃，整群統進統出懷孕分娩母豬及仔豬，以便加強衛生管理，提昇生產工作效率。
2. 使分娩及人員工作調度安排更為方便，避免母豬於週末、假期及晚上分娩。
3. 預防母豬及新母豬之逾期分娩，改善有永久黃體不發情母豬群，以期恢復發情週期再配種加入生產。
4. 便利在同一區域畜舍、同時段分娩、集體管理與照顧，剛出生仔豬窩數大小調整交互哺育，使分娩舍及器具設備發揮最大之利用效果。

【適應症】

母豬：具有黃體分解作用，並興奮子宮肌肉之活動力，誘導懷孕母豬流產或做定期自然分娩。

【用法用量】

1. 該母豬配合管理上需要使用本劑之前，其應具備有完整的配種日期，依照豬隻懷孕期111~119日(平均115日)計算出預定分娩日，在預定分娩前2日或適當特定管理上需要之日期，注射本劑做定期誘導分娩。約有95%懷孕母豬，注射本劑後36小時內即可完成分娩(除了即將自然分娩者例外，大部份的均在注射本劑後24±5小時內分娩完畢)。
2. 每頭母豬使用劑量為2mL，以肌肉深部注射(最好使用4公分長的注射針頭)。

【注意事項】

1. 於25°C以下、避光儲存。
2. 請在有效期限內使用。
3. 本劑專供母豬使用，注射本劑24小時內之母豬，請勿屠宰供人食用。
4. 未能在預定分娩前或太早注射本劑，將使分娩之小豬早產無法育成，即在平均分娩前3日(含)以注射時，可能增加不能有育成之仔豬數。
5. 本劑可經由皮膚吸收，具有生育年齡、懷孕婦女及氣喘病患者避免接觸，因意外濺及皮膚時，應立刻用清水洗乾淨。
6. PGF_{2α}型之前列腺素可能引起人之支氣管痙攣，若因意外吸入或注射本劑引致呼吸困難時，應使用速效型之支氣管擴張劑如Isoprenaline或Salbutamol治療之。

本處方藥品限由執業獸醫師(佐)使用

【本產品適應症、建議使用方式、禁忌症、警語、儲存條件及相關注意事項，請詳閱仿單內容】

【包裝規格】20、50、100毫升瓶裝

產品批號、製造日期及有效日期請見瓶身標示

本製造廠通過台灣檢驗科技股份有限公司(SGS Taiwan Ltd.) ISO 9001認證

vetnosterum

永鴻國際生技股份有限公司
VETNOSTRUM ANIMAL HEALTH CO., LTD.
台北市松山區民權東路三段181號12樓 | 02-2718-6200
新竹廠：新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號
產品編號：431025020 217516443

