

藥物配方推薦及使用時機

階段	使用時機	建議藥品	劑量 (Kg/Ton)	使用天數	階段	使用時機	建議藥品	劑量 (Kg/Ton)	使用天數	
離乳豬	氣候驟變/併欄/ 緊迫因子	歐羅肥® SP500	1.14	7-14天	肥育豬	持續性乾咳	歐羅肥® STP500	1.14-2.28	14-21天	
	預防PRRS引發 之複合性 細菌感染症	歐羅肥® SP500	1.14	14天			金旺S-110	1-2		
		歐羅肥®15.4%	2.5				太妙素	0.5-1		
		複合性呼吸道 細菌感染症	金順			1-2	急性豬赤痢或 迴腸炎	歐羅肥® STP500	1.14-2.28	14-21天
			歐羅肥® SP500			1.14		歐羅肥®15.4%	2.5	
	歐羅肥®15.4%		2.5	金旺S-110		1-2				
	複合性細菌下痢	金順	1	14天	太妙素	0.5-1				
		快治樂2%	2		預防黴漿菌 感染症 如產房小豬 關節腫大	歐羅肥® STP500	1.14-2.28	14-21天		
		歐羅肥® SP500	1.14			歐羅肥®15.4%	2.5			
		歐羅肥®15.4%	2.5			金旺S-110	1			
	保育豬	複合性呼吸道 細菌感染症	泰駱素	1	14天	母豬	產房小豬 呼吸道細菌感染	歐羅肥® STP500	2.28	14-21天
			太妙素	0.5				歐羅肥®15.4%	2.5	
預防止宮細菌 感染問題 (分娩前兩周開始投予)			歐羅肥® STP500	1.14-2.28				21-28天		
歐羅肥®15.4%		2.5								
複合性消化道 細菌感染症		歐羅肥® SP500	1.14	14天	進產房前一個月 (降低產床上病菌感染壓力)		歐羅肥® STP500	1.14-2.28	21-28天	
		歐羅肥®15.4%	2.5				安膜西林 50%			
		泰駱素	1			視疾病情況可供選擇搭配使用				
		太妙素	0.5							
急性豬赤痢或 迴腸炎		歐羅肥® SP500	1.14	14天						
		歐羅肥®15.4%	2.5							
		金旺S-110	1-2							
		太妙素	0.5-1							

視疾病情況可供選擇搭配使用



歐羅肥® SP 500 Aureo SP500

成分 每公斤含有 氯四環素鈣鹽 Chlortetracycline Calcium complex ----- 88 gm
磺胺二甲嘧啶 Sulfamethazine ----- 88 gm
配尼西林 Procaine Penicillin G ----- 44 gm

用法用量 每噸飼料添加1.14公斤，視病情調整用量。

- 注意事項**
1. 體重60公斤以上之豬隻不可使用。
 2. 本藥品由飼主、畜禽水產養殖業者或飼料廠依獸醫師處方使用
 3. 停藥期15日。
 4. 請儲存於乾燥涼爽處。
 5. 不得連續使用本藥超過兩周。

包裝規格 25公斤

Aureo SP500
歐羅肥®
SP 500 動物藥製字 第08457號

吸收快速
長效分佈

完美比例
廣效殺菌

獨家製程
精選包覆



完美搭配組合 殺菌快分布廣 長效抗菌

三種抗菌機制不同之抗生素，
讓病菌無處可躲

CHLORTETRACYCLINE (CTC) 88Gm/Kg
速效抑菌劑

- 1 抑制細菌的蛋白質合成，對於G(+)、G(-)、螺旋體屬、立克次體、*Mycoplasma suis*具有抗菌作用
- 2 CTC鈣鹽 $\xrightarrow{\text{胃酸}}$ CTC - HCl + Ca^{++} (Ca^{++} 供動物吸收，強化鈣質)
- 3 此藥可達到各器官和體液(如:乳汁/尿液)也通過胎盤障壁將藥物濃度提供給胎兒

SULFAMETHAZINE 88Gm/Kg
廣效磺胺抑菌劑

- 1 干擾細菌葉酸代謝，抑制細菌生長繁殖力
- 2 生物利用率高，低濃度效果持續

PROCAINE PENICILLIN G. 44Gm/Kg
長效殺菌劑

- 1 抑制細菌細胞壁的合成
- 2 在細菌繁殖期具有強效殺菌作用



比較磺胺劑抗生素，於血清中藥物濃度變化

Parameters	單位	歐羅肥® STP	歐羅肥® SP500
$t_{1/2\alpha}$ (藥物分布半衰期)	h	1.179±0.570	0.226±0.161
$t_{1/2\beta}$ (藥物消除半衰期)	h	9.01±1.55	9.84±0.64
$AUC_{0\rightarrow\infty}$	mg/L	447±39	1485±41

歐羅肥® SP500 分布速度較快，
藥物在時間曲線下的面積(AUC)最高！

歐羅肥® SP500 使用後複合藥效持續時間長，
且吸收快速，減量搭配使用效果佳。

摘錄自：VAN POUCKE, L. and VAN PETEGHEM, C., 1994. Pharmacokinetics and Tissue Residues of Sulfathiazole and Sulfamethazine in Pigs. Journal of Food Protection, 57(9): p.796-801.




歐羅肥® SP500(Sulfamethazine) 比
歐羅肥® STP(Sulfathiazole) 更快速達到
血清中最高濃度。

獨家專利造粒 確效100% 藥效最穩定

精選原料與專利造粒製程，完整保留
藥物與營養素

歷經一甲子製藥經驗，鑽研「創新低溫擠壓造粒」，藥物成分及營養素不受外界環境濕度影響損壞，讓動物們獲取100%效果與營養。

永鴻給您最安心保障的產品 -
原料嚴格篩選品管，特殊藥物製作過程，藥物安定性最佳。




高溫與長時間保存藥物效果不受影響

歐羅肥® SP500 全場細菌問題 一併解決

歐羅肥® SP500
各別成分組合之使用試驗結果

餵飼三種不同藥物組合之增重效果，
於小豬離乳後3-9週之效果比較

使用歐羅肥® SP500
降低複合性細菌感染風險，
讓豬隻健康採食，增重效率佳！



添加量(克/噸)/組別	對照組	CTC	CTC+Sulfamethazine	歐羅肥® SP500
CTC	0	100	100	100
Sulfamethazine	0	0	100	100
Penicillin	0	0	0	50
開始測試豬數	123	123	123	123
離乳後3週平均體重(kg)	5.49	5.49	5.49	5.59 🏆
離乳後9週平均體重(kg)	14.24	17.83	19.6	21.55 🏆
平均總增重(kg)	8.75	12.34	14.11	16.01 🏆
平均日增重(kg)	0.2	0.29	0.34	0.38 🏆
平均飼料重(kg)	0.47	0.59	0.64	0.74 🏆

結果顯示，歐羅肥® SP500 三種不同藥物組合，可見離乳後九週平均體重顯著增加，平均日增重及飼料量皆為其他試驗組別中表現最優異。