

沛易麻 DEXMOPET 0.5 mg/ml; 10ml

Dexmedetomidine 0.42 mg
(as Dexmedetomidine hydrochloride 0.5mg)
Methyl parahydroxybenzoate (E218) 1.6mg
Propyl parahydroxybenzoate 0.2mg

適用動物 犬、貓 **適應症** 對於犬貓進行手術和檢查時，提供其抑制、鎮靜與止痛的作用。

用法用量 本品不建議重複投藥。詳細用量請遵循仿單。



貓 體重(kg)	Dexmedetomidine 40mcg/kg 肌肉注射	
	(mcg/kg)	(ml)
1-2	40	0.1
2-3	40	0.2
3-4	40	0.3
4-6	40	0.4
6-7	40	0.5
7-8	40	0.6
8-10	40	0.7



犬 體重(kg)	Dexmedetomidine 125mcg/m ² 肌肉注射		Dexmedetomidine 375mcg/m ² 肌肉注射		Dexmedetomidine 500mcg/m ² 肌肉注射	
	(mcg/kg)	(ml)	(mcg/kg)	(ml)	(mcg/kg)	(ml)
2-3	9.4	0.04	28.1	0.12	40	0.15
3-4	8.3	0.05	25	0.17	35	0.2
4-5	7.7	0.07	23	0.2	30	0.3
5-10	6.5	0.1	19.6	0.29	25	0.4
10-13	5.6	0.13	16.8	0.38	23	0.5
13-15	5.2	0.15	15.7	0.44	21	0.6
15-20	4.9	0.17	14.6	0.51	20	0.7

對象動物使用注意事項與副作用

- Dexmedetomidine具有刺激α₂-腎上腺素的作用，會造成心跳速率及體溫的下降。
- 對部分犬貓會有呼吸速率降低的現象發生。
- 血壓最初會升高之後即恢復正常或低於正常值。
- 建議使用生理監測器有助於監控呼吸及心臟功能。
- 犬貓在投藥及恢復期間皆須留意體溫恆定以維持保暖。
- 注射後5-10分鐘可能有嘔吐反應發生，部份犬貓在亦可能產生嘔吐現象。
- 對於16週以下之幼犬及12週以下之幼貓研究尚未被建立。
- 對於配種用之公犬/公貓的安全性亦尚未被評估。
- 應謹慎用於心血管疾病、嚴重系統性疾病、肝臟或腎臟功能損傷的動物。

麻易解 Tipafar 5mg/ml; 10ml



Atipamezole 4.27mg (as atipamezole hydrochloride 5.0mg)
Methyl parahydroxybenzoate 1.0mg

適用動物 犬、貓 **適應症** 消除Medetomidine 和Dexmedetomidine 對犬貓的鎮靜作用。

用法用量 單次肌肉注射使用。

使用劑量：依據前次Dexmedetomidine hydrochloride 的劑量而定。
使用時間：Dexmedetomidine hydrochloride 注射15-60分鐘後施打。
施打本品後，犬貓恢復期約5分鐘，約10分鐘即可恢復活動力。
犬：Atipamezole hydrochloride 的施打劑量(以µg/kg體重)為單位，為前次注射Dexmedetomidine hydrochloride 的10倍劑量。
故本品施打體積(ml)應與前次Dexmedetomidine hydrochloride (0.5 mg/ml)一致。
貓：Atipamezole hydrochloride 的施打劑量(以µg/kg體重)為單位，為前次注射Dexmedetomidine hydrochloride 的5倍劑量。
故本品施打體積(ml)應為前次注射Dexmedetomidine hydrochloride (0.5 mg/ml) 的1/2。

對象動物使用注意事項與副作用 詳細注意事項請遵循仿單。



安全速效

甦醒無憂

沛易麻 麻醉劑 DEXMOPET Dexmedetomidine 0.5mg/ml

麻易解 解劑 TIPAFAR Tipafar 5mg/ml



搭配解劑使用，
有效增加麻醉安全性！
優良甦醒品質！



沛易麻

麻醉劑

Dexmedetomidine 0.5mg/ml

犬貓專用鎮靜麻醉注射劑

平衡麻醉首選藥物

Dexmedetomidine 為高選擇性 α_2 腎上腺素受體活化劑，可作為犬貓臨床檢查、手術搭配、全身麻醉前，使用之鎮靜、止痛、肌肉鬆弛效果藥物。

作為全身麻醉前用藥可降低麻醉誘導與維持時，液體麻醉與氣體麻醉藥之需求量。

具有解劑Atipamezole可使用，於鎮靜麻醉時可幫助獸醫師更容易調整與操控麻醉深度，增加鎮靜安全性與甦醒品質。

提供病患更安全的平衡麻醉用藥選擇！

DEXMOPET



DEXMOPET

Dexmedetomidine 0.5mg/ml 犬貓專用鎮靜麻醉注射劑

DEXMOPET

解劑搭配使用
安全性高

麻易解 Tipafar 5mg/ml


甦醒品質佳

快速生效

10分鐘達最高血液濃度

優良鎮靜效果

動物藥入字
第07364號



單次使用量
價格優勢

非管制藥品

平衡麻醉
利用效果佳

減少吸入性麻醉劑使用量

具止痛效果

可搭配其他止痛藥物
減少個別藥物副作用

DEXMOPET