

安莫西林 系列

Amoxicillin Powder
20% & 50%

動物藥製字
第07520號
第07577號


安莫西林散主成分 Amoxicillin 為一種半合成的廣效 Penicillin 製劑，對於革蘭氏陽性菌及陰性菌均有強力的殺菌作用。

安莫西林 對細菌之作用機制

吸收快

毒性低

性質安定



品質穩定 效果確實

從原料控管到製造流程，皆來自歐盟專利工藝，歷經超過40種檢驗程序，精心打造確保安莫西林成分的穩定性、藥物濃度及密度、甚至顆粒粒徑(大小均勻)，使產品在水中迅速崩解，釋放100%藥效。


永鴻 安莫西林系列 於不同條件下之穩定性試驗

產品 檢測項目	安莫西林 20% AXP2	安莫西林 50% AXP5
室溫	99.4 %	102.0 %
pH 4.0	100.8 %	103.8 %
pH 7.0	100.7 %	104.2 %
25 °C、15天	97.6 %	104.0 %
40 °C、15天	94.0 %	97.8 %
80 °C、30分鐘	97.4 %	101.4 %
80 °C、60分鐘	96.3 %	99.1 %

安莫西林 系列

Amoxicillin Powder
20% & 50%

適應症



造粒製程
不易揚塵

自來水及硬水中溶解迅速
不沉澱、不卡管

藥效廣泛
作用確實

規格與成分

安莫西林 20% (AXP2) 每克中含有 Amoxicillin trihydrate 200mg(Potency)

安莫西林 50% (AXP5) 每克中含有 Amoxicillin trihydrate 500mg(Potency)

物種	雞(不含產蛋中之蛋雞)		豬	
規格	20%	50%	20%	50%
停藥期	5天	7天	15天	
用法用量	100mg加入400公升中飲用，連續使用2-3天。	100mg加入1噸水中飲用，連續使用2-3天。	每公斤體重使用50mg，一天兩次，連續使用3-5天泡於水中飲用或直接灌食。	每公斤體重使用20mg，一天兩次，連續使用3-5天泡於水中飲用或直接灌食。
適應症	大腸桿菌症、沙門氏菌症、傳染性鼻炎及細菌性下痢		大腸桿菌症、沙門氏菌症、嗜血桿菌症、巴氏桿菌症、萎縮性鼻炎、豬丹毒、腦膜炎	
注意事項	• 雞16週齡以上與產蛋中之蛋雞不得使用。 • 至少持續使用48小時直至症狀消失；請勿連續使用超過7天。			

