



Grantfine®
Injection

賜來好®

懸濁注射液 Cefquinome 2.5%

第四代頭孢子菌素類抗生素主要作用為抑制細菌細胞壁合成。

- ① 對革蘭氏陽性及陰性菌具有良好殺菌效果。
- ② 對豬及牛之細菌性呼吸道疾病與腸炎有卓越的治療效果。
- ③ 可通過腦脊髓液及關節囊液，有效處理腦膜炎及關節炎造成之患疾。

產品特點

● 抗菌效果廣泛

- 第四代頭孢子素抗生素
- 殺菌範圍廣
- 效果確實

● 用量省

- 劑量少
- 作用強
- 療效迅速

● 毒性低

- 安全性高
- 抗藥性低
- 無副作用

● 組織分佈廣

- 半衰期長
- 藥物可達腦脊髓液與關節囊液，讓細菌無處可逃。



賜來好® 懸濁注射液

Grantfine® Injection 2.5%

成分

每ml中含有:Cefquinome (Sulfate) 25mg

建議使用方法

建議使用劑量 (每天一次)

品種

適應症


體重(Kg)

劑量(ml)

治療期間(天)

牛

- 呼吸道疾病
巴斯德桿菌
Mannheimia haemolytica,
Histophilus somni



50

2

3-5

- 蹄趾炎
蹄趾壞死(腐蹄病)、急性趾間壞死桿菌症(蹄葉炎)

50

2

3-5

- 急性大腸桿菌性乳房炎
大腸桿菌
金黃色葡萄球菌
異乳鏈球菌
無乳鏈球菌
乳房鏈球菌




50

2

2

仔豬

- 腦膜炎/關節炎
第二型豬鏈球菌、大腸桿菌
及鏈球菌屬引起之症狀



10

0.8

5

- 滲出性皮膚炎
葡萄球菌引起之症狀



豬

治療由巴斯德桿菌、豬嗜血桿菌、放線桿菌胸膜肺炎、
第二型豬鏈球菌所引起肺臟、呼吸道感染。

50

4

3

由大腸桿菌、鏈球菌屬具感受性微生物所引起乳房炎-
子宮炎-無乳症(MMA)

50

4

2

包裝

100ml

注意事項

- 本藥勿投予體重低於1.25 kg之動物。
- 對β-lactam類抗生素過敏時，避免使用本藥。
- 使用前需將本藥搖晃均勻。
- 停藥期：牛 - 食用部位：5日，乳汁：1日。
豬 - 食用部位：3日。