## 賜來富®

## 滅菌懸浮液 5%

GRI5 動物藥製字 第08514號

動物用注射劑 (滅菌懸劑)

### **Grantlife**<sup>®</sup>Injection 5%

Ceftiofur Hydrochloride是一種新一代具廣效抗菌譜的頭孢子素類抗生素 (Cephalosporin antibiotic),其在獸醫學上 ,已被證實對許多革蘭氏陰性及陽性菌及具有betalactamase之細菌均具有非常優異的殺菌效果;Ceftiofur Hydrochloride治療豬、牛的呼吸道之細菌性肺炎疾病,具有優異的治療效果。

【成份】每毫升(mL)含有Ceftiofur .......50 mg (Potency) 

### 【特點】

- 1. 本藥是動物專用之新型廣效性抗生素,故殆無誘發耐性菌之虞。
- 2. 本藥抗菌範圍廣泛,對絕大多數的革蘭氏陽性及陰性細菌引起之混合感染症,具有優越的殺菌效果。
- 3. 本藥使用劑量少,作用強,且療效迅速。
- 4. 本藥毒性低、安全性高, 殆無副作用。
- 5. 本藥可使用於泌乳期之乳牛,搾乳期無需停藥措施。

### 【適應症】

牛、豬-治療因胸膜肺炎放線桿菌及巴氏桿菌所引起之呼吸道疾病,由壞死性梭菌(Fusobacterium necrophorum) 和黑色素生成菌(Bacteroides melanogenicus)所造成的蹄真皮炎,子宫炎和所有對Ceftiofur有感受性的細菌所引

### 【用法用量】

豬、牛-依每10公斤體重計算如下;

牛:0.2~0.4 mL,行肌肉注射;

豬:0.2~0.6 mL, 行肌肉或皮下注射,

以上每日注射一次,連續使用3天。

### 【注意事項】

- 1.本藥為動物專用,請勿使用於人,並應置於兒童無法取得之處。
- 2.避免與皮膚或黏膜接觸,以免引起過敏反應。
- 3.本藥經開封後保存期限為二個月內。
- 4.停藥期:肉豬為2天;肉牛為2天;乳牛:0天。
- 5.使用前必需充份搖晃均勻。

本處方藥品限由執業獸醫師(佐)監督之下使用

【包裝規格】100毫升瓶裝

產品批號、製造日期及有效日期請見瓶身標示

本製造廠通過台灣檢驗科技股份有限公司(SGS Taiwan Ltd.) ISO 9001認證



## 永鴻國際生技股份有限公司 VETNOSTRUM ANIMAL HEALTH CO., LTD.

台北市松山區民權東路三段181號12樓 | 02-2718-6200

217514942

# 賜來富®

乾粉注射液/滅菌懸浮液

## **Grantlife® Injection**

動物藥製字 第08514號 動物藥製字第08371號



# 產品優勢

抗菌效果廣本藥為第三代頭孢子素抗生素,對革蘭氏陽性 及陰性細菌引起之感染症,具殺菌效果。

零停藥期 滅菌懸浮注射液 針對泌乳期之乳牛及乳羊, 停藥期0天

用量少作用強效,安全性高,無副作用。









# 賜來富® 乾粉注射液/滅菌懸濁液

# **Grantlife**® Injection

成分

乾粉注射劑 - 每瓶含有 Ceftiofur Sodium ..... 4g 滅菌懸浮注射液 - 每ml含有 Ceftiofur ..... 50mg (Potency)

| 建議使用方法        |   |  |
|---------------|---|--|
| 品種            | 適應症   | 建議使用方法   |
| 牛、羊           | 治療呼吸道疾病(肺炎及輸送熱),<br>溶血性/敗血性巴斯德桿菌及嗜血桿菌<br>之混合感染。 | 乾粉注射劑 -<br>每公斤體重肌肉注射1.1-2.2mg。<br>每日一次,連續3天,視狀況嚴重性可增加<br>1-2天療程。<br>滅菌懸浮液 -<br>每10公斤體重肌肉注射0.2-0.4ml,<br>每日一次,連續使用3天。 |
| <b>豬</b>      | 治療細菌性肺炎<br>(放線桿菌胸膜肺炎,嗜血桿菌,巴斯<br>德桿菌,沙門氏菌,鏈球菌)   | 乾粉注射劑 -<br>每公斤體重肌肉注射3-5mg。<br>每日一次,連續3天。<br>滅菌懸浮液 -<br>每10公斤體重肌肉或皮下注射0.2-0.6ml,<br>每日一次,連續使用3天。                      |
| 一日齡雞及火雞       | 治療大腸桿菌症。  | <b>乾粉注射劑</b> -<br>一日齡雞:<br>每隻雞頸部皮下注射0.08-0.2mg。<br>一日齡火雞:<br>每隻火雞頸部皮下注射0.17-0.5mg。                                   |
| 犬             | 治療因大腸桿菌和 <i>Proteus Mirabilis</i><br>引起的尿道感染症。  | 乾粉注射劑 -<br>每公斤體重皮下注射5mg。<br>每日一次,連續5-14天。  |
| 乾粉注射液 - 100ml |   |  |

### 包裝

**乾粉注射液 - 100ml 稀釋瓶 (內含本藥粉劑4g)** 滅菌懸浮液 - 100ml

### 注意事項

- 本處方藥品限由執業獸醫師(佐)監督之下使用。
- ·本藥請於25°C以下、避光儲存,開封後四週內使用完畢。
- ·本藥勿投予體重低於1.25 kg之動物。
- · 對β-lactam類抗生素過敏時,避免使用本藥。
- ·停藥期:乾粉注射劑-5天。

滅菌懸浮注射液 - 肉豬:2天、肉牛:2天、泌乳牛:0天