

賜來富®

乾粉注射液 / 滅菌懸浮液

Grantlife® Injection

動物藥製字 第08514號

動物藥製字 第08371號



產品優勢

抗菌效果廣 本藥為第三代頭孢子素抗生素，對革蘭氏陽性及陰性細菌引起之感染症，具殺菌效果。

零停藥期 滅菌懸浮注射液 針對泌乳期之乳牛及乳羊，停藥期0天

用量少 作用強效，安全性高，無副作用。



成分

乾粉注射劑 - 每瓶含有 Ceftiofur Sodium 4g
滅菌懸浮注射液 - 每ml含有 Ceftiofur 50mg (Potency)

建議使用方法

品種	適應症	建議使用方法
牛、羊	治療呼吸道疾病(肺炎及輸送熱)，溶血性/敗血性巴斯德桿菌及嗜血桿菌之混合感染。	乾粉注射劑 - 每公斤體重肌肉注射1.1-2.2mg。 每日一次，連續3天，視狀況嚴重性可增加1-2天療程。 滅菌懸浮液 - 每10公斤體重肌肉注射0.2-0.4ml， 每日一次，連續使用3天。
豬	治療細菌性肺炎 (放線桿菌胸膜肺炎，嗜血桿菌，巴斯德桿菌，沙門氏菌，鏈球菌)	乾粉注射劑 - 每公斤體重肌肉注射3-5mg。 每日一次，連續3天。 滅菌懸浮液 - 每10公斤體重肌肉或皮下注射0.2-0.6ml， 每日一次，連續使用3天。
一日齡雞及火雞	治療大腸桿菌症。	乾粉注射劑 - 一日齡雞： 每隻雞頸部皮下注射0.08-0.2mg。 一日齡火雞： 每隻火雞頸部皮下注射0.17-0.5mg。
犬	治療因大腸桿菌和 <i>Proteus Mirabilis</i> 引起的尿道感染症。	乾粉注射劑 - 每公斤體重皮下注射5mg。 每日一次，連續5-14天。

包裝

乾粉注射液 - 100ml 稀釋瓶 (內含本藥粉劑4g)
滅菌懸浮液 - 100ml

注意事項

- 本處方藥品限由執業獸醫師（佐）監督之下使用。
- 本藥請於25°C以下、避光儲存，開封後四週內使用完畢。
- 本藥勿投予體重低於1.25 kg之動物。
- 對β-lactam類抗生素過敏時，避免使用本藥。
- 停藥期：**乾粉注射劑** - 5天。
滅菌懸浮注射液 - 肉豬:2天、肉牛:2天、泌乳牛:0天

