



立可治®

長效注射液 30%

動物藥製字 第08820號

Florfenicol

Injection 30%



產品特點

氯黴素類抗生素中，抗菌效果最佳者

作用機制:干擾細菌蛋白質合成導致細菌死亡。

- ★ 快速:迅速且持久的藥理作用，在體內2小時即可達到最高濃度，且可維持18小時藥物效果。
- ★ 強效:含氟化學結構，增強抗菌效果。
- ★ 高脂溶性:迅速進入血腦屏障，達到全面療效。

立可治®

長效注射液 30%

Likerjyh® Injection 30%

成分

Florfenicol.....300mg(Potency)

適應症

牛、豬 - 治療因嗜血桿菌、黴漿菌、豬胸膜肺炎放線桿菌、巴斯德桿菌所引起的呼吸道感染。

用法用量

牛 - 每15kg肌肉注射本藥1mL，注射2劑，間隔48小時。每15kg皮下注射本藥2mL。
豬 - 每20kg肌肉注射本藥1mL，注射2劑，間隔48小時。
本藥每一注射部位注射劑量不得超過10mL。應使用16號針頭進行注射。

豬 體重-用量速算表

體重(kg)	豬 劑量(mL)
60	3
90	4.5
120	6
150	7.5
180	9
210	10.5

牛 體重-用量速算表

體重(kg)	牛 劑量(mL)
60	4
120	8
180	12
240	16
300	20
600	40

包裝

100mL

注意事項

- 禁用於分娩前2個月妊娠牛、泌乳期或乾乳期之乳牛。如需使用本藥，應經獸醫師風險評估方可使用。
- 停藥期：
肉用牛 - *肌肉注射:30天。
 *皮下注射:44天。
乳牛 - 泌乳期間禁止使用。
肉豬 - 14天。

