

一針長效 -

- ① 肌肉注射血中有效濃度可維持3-4天，效果持久，減少操作困擾。
- ② 廣效性抗生素，有效治療腐蹄病、關節炎、產後無乳症、術後、產後及流產等不明原因之感染。

多剋星®

OKISI® 20%

成分

每毫升中含有Oxytetracycline 200mg (Potency)

適應症

牛、豬、羊 - 治療巴氏桿菌症、肺炎及胸膜炎、膿瘍、傷口感染且也能控制術後及產後之感染。

豬 - 治療MMA(乳房炎及子宮炎無乳症綜合症)、丹毒、子宮炎、臍帶炎、關節炎、豬萎縮性鼻炎。

牛 - 治療放線桿菌病、犢白喉、腐蹄病、乳房炎、邊蟲病、心包積水症、角膜結膜炎。

羊 - 治療腐蹄病、乳房炎、子宮炎、臍帶炎、關節炎、地方性流產。

用法用量

深部肌肉注射投藥：

治療使用劑量每公斤體重使用 20 mg (相當於每 10 公斤體重使用本品 1 ml)，100 公斤以上動物，最好劑量分半，分別注射兩個不同的部位。

體重-用量速算表

體重 (kg)	用量 (ml)	體重 (kg)	用量 (ml)
10	1	100	10
20	2	150	15
50	5	200	20
90	9	300	30

注意事項

- 本處方藥品限由執業獸醫師(佐)監督之下使用。
- 本藥請在室溫25°C以下避光儲存。
- 本藥不適用於狗、貓及馬。
- 經濟動物屠宰前21天停止使用，搾乳動物於搾乳前7天停止使用。
- 停藥期：14天。



多剋星®

土黴素注射液 20%

OKISI® Oxytetracycline 20%

細菌感染剋星

多剋星®

繁殖相關疾病 - 乳房炎、子宮炎、無乳症綜合症

呼吸系統性疾病 - 肺炎、胸膜炎、鼻炎

骨關節病 - 腐蹄病、關節炎

產房常見感染 - 膿瘍、傷口感染、臍帶炎、
術後及產後感染

