

一、成分：
本產品每一公克含有
氟滅菌(Flumequine).....500 MG

動物用
散劑

動物藥製字第08088號

二、效能(適應症)：
雞(不含產蛋中之蛋雞)：
治療大腸桿菌症、沙氏桿菌症、巴氏桿菌症、傳染性鼻炎、細菌性腸炎、葡萄球菌症、雞慢性呼吸器病。
豬：治療細菌性下痢症、細菌性支氣管炎、巴氏桿菌症、沙氏桿菌症、大腸桿菌症、嗜血桿菌肺炎、放線桿菌性胸膜肺炎、萎縮性鼻炎。

本製造廠通過台灣檢驗科技股份有限公司
(SGS Taiwan Ltd.) ISO 9001認證

富力星 50%

Frucin 50%

Powder

1公斤



三、用法及用量：
治療：每公升飲水中添加本藥用量300mg，
使水中含氟滅菌150ppm。

四、注意事項：
1.本藥品由飼主、畜禽水產養殖業者或飼料廠依獸醫師（佐）處方使用。
2.避免太陽直接照射本劑。
3.請儲放在陰涼乾燥處。
4.停藥期：7日。
5.雞16週齡以上不得使用。產蛋中之蛋雞不得使用。

永鴻國際生技股份有限公司
台北市松山區民權東路三段181號12樓
電話：(02)27186200

永鴻國際生技股份有限公司 新竹廠
新竹縣新豐鄉中崙村中崙290之3號
中華民國 台灣製造

產品編號：
有效期限：
製造批號：
製造日期：



一、成分：
本產品每一公克含有
氟滅菌(Flumequine).....500 MG

動物用
散劑

動物藥製字第08088號

二、效能(適應症)：
雞(不含產蛋中之蛋雞)：
治療大腸桿菌症、沙氏桿菌症、巴氏桿菌症、傳染性鼻炎、細菌性腸炎、葡萄球菌症、雞慢性呼吸器病。
豬：治療細菌性下痢症、細菌性支氣管炎、巴氏桿菌症、沙氏桿菌症、大腸桿菌症、嗜血桿菌肺炎、放線桿菌性胸膜肺炎、萎縮性鼻炎。

富力星 50%

Frucin 50%

Powder

5公斤



本製造廠通過台灣檢驗科技股份有限公司
(SGS Taiwan Ltd.) ISO 9001認證

三、用法及用量：
治療：每公升飲水中添加本藥用量300mg，
使水中含氟滅菌150ppm。

四、注意事項：
1.本藥品由飼主、畜禽水產養殖業者或飼料廠依獸醫師（佐）處方使用。
2.避免太陽直接照射本劑。
3.請儲放在陰涼乾燥處。
4.停藥期：7日。
5.雞16週齡以上不得使用。產蛋中之蛋雞不得使用。

永鴻國際生技股份有限公司
台北市松山區民權東路三段181號12樓
電話：(02)27186200

永鴻國際生技股份有限公司 新竹廠
新竹縣新豐鄉中崙村中崙290之3號
中華民國 台灣製造

產品編號：
有效期限：
製造批號：
製造日期：



一、成分：
本產品每一公克含有
氟滅菌(Flumequine).....500 MG

動物用
散劑

動物藥製字第08088號

二、效能(適應症)：
雞(不含產蛋中之蛋雞)：
治療大腸桿菌症、沙氏桿菌症、巴氏桿菌症、傳染性鼻炎、細菌性腸炎、葡萄球菌症、雞慢性呼吸器病。
豬：治療細菌性下痢症、細菌性支氣管炎、巴氏桿菌症、沙氏桿菌症、大腸桿菌症、嗜血桿菌肺炎、放線桿菌性胸膜肺炎、萎縮性鼻炎。

本製造廠通過台灣檢驗科技股份有限公司
(SGS Taiwan Ltd.) ISO 9001認證

富力星 50%

Frucin 50%

Powder

20公克



三、用法及用量：
治療：每公升飲水中添加本藥用量300mg，
使水中含氟滅菌150ppm。

四、注意事項：
1.本藥品由飼主、畜禽水產養殖業者或飼料廠依獸醫師（佐）處方使用。
2.避免太陽直接照射本劑。
3.請儲放在陰涼乾燥處。
4.停藥期：7日。
5.雞16週齡以上不得使用。產蛋中之蛋雞不得使用。

永鴻國際生技股份有限公司
台北市松山區民權東路三段181號12樓
電話：(02)27186200

永鴻國際生技股份有限公司 新竹廠
新竹縣新豐鄉中崙村中崙290之3號
中華民國 台灣製造

產品編號：
有效期限：
製造批號：
製造日期：



一、成分：
本產品每一公克含有
氟滅菌(Flumequine).....500 MG

動物用
散劑

動物藥製字第08088號

二、效能(適應症)：
雞(不含產蛋中之蛋雞)：
治療大腸桿菌症、沙氏桿菌症、巴氏桿菌症、傳染性鼻炎、細菌性腸炎、葡萄球菌症、雞慢性呼吸器病。
豬：治療細菌性下痢症、細菌性支氣管炎、巴氏桿菌症、沙氏桿菌症、大腸桿菌症、嗜血桿菌肺炎、放線桿菌性胸膜肺炎、萎縮性鼻炎。

本製造廠通過台灣檢驗科技股份有限公司
(SGS Taiwan Ltd.) ISO 9001認證

富力星 50%

Frucin 50%

Powder

___公克/公斤



三、用法及用量：
治療：每公升飲水中添加本藥用量300mg，
使水中含氟滅菌150ppm。

四、注意事項：
1.本藥品由飼主、畜禽水產養殖業者或飼料廠依獸醫師（佐）處方使用。
2.避免太陽直接照射本劑。
3.請儲放在陰涼乾燥處。
4.停藥期：7日。
5.雞16週齡以上不得使用。產蛋中之蛋雞不得使用。

永鴻國際生技股份有限公司
台北市松山區民權東路三段181號12樓
電話：(02)27186200

永鴻國際生技股份有限公司 新竹廠
新竹縣新豐鄉中崙村中崙290之3號
中華民國 台灣製造

產品編號：
有效期限：
製造批號：
製造日期：

