

動物用 散劑	新型抗菌劑	___gm/kg
【適應症】 1. 雞、火雞（不含產蛋中之蛋雞）： 治療傳染性鼻炎、大腸桿菌症及雞白痢。 2. 鱸形目： 治療對本藥具有感受性發光桿菌或親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或愛德華氏菌感染。 鰻形目：治療對本藥具有感受性親水性產氣單胞菌群或螢光假單胞菌或愛德華氏菌感染。 【用法 用量】 1. 雞、火雞（不含產蛋中之蛋雞） 每公升飲水添加本藥之用量如下： 治療：300毫克(150PPM)使用5~7天，隔7~10天後再投藥3~5天。 2. 鱸形目、鰻形目經口投與： 20毫克／公斤／日，連續3~5天。 動物藥製字第07271號	伏菌[®] 散 50% Chemix[®] Powder 50% CHP5 每公克中含: Flumequine.....500mg	【注意事項】 1. 停藥期：雞、火雞（不含產蛋中之蛋雞）7天；鱸形目8天，鰻形目20天。 2. 水產動物不得連續使用7天以上。 3. 雞16週齡以上不得使用，產蛋中之蛋雞不得使用。 4. 本藥品由飼主、畜禽水產養殖業者或飼料廠依獸醫師（佐）處方使用。 請在有效期限內使用。 製造批號、日期及有效期限： 請詳見本產品外包裝上之標示。 本製造廠通過台灣檢驗科技股份有限公司 (SGS Taiwan Ltd.) ISO 9001認證
		永鴻國際生技股份有限公司 公司地址：台北市松山區民權東路三段181號12樓 新 竹 廠：新竹縣新豐鄉中崙村中崙290之3號 (03)621 6688 產品編號：