



疳 克[®]

Conquer[®] Powder

家禽家畜之臟器及組織中除微生物外尚有甚多種之寄生蟲棲息，會妨害動物之發育，或引起一定之病症如腹瀉、貧血、精神不振，引起成群動物的死亡，其危害不亞於傳染病。

治療內寄生蟲病之基本原則為用藥後能毒殺寄生蟲或使其麻痺後排出體外，而對宿主無毒性或毒性輕微，本藥依此原則，特精心選定Mebendazole調製而成。

現市場上對蛔蟲、鈎蟲、蟯蟲之驅除已有多種藥品，但單獨對鞭蟲感染症或混合感染症有直接作用之治療藥劑仍是闕如，本藥仍應運推出，係針對鞭蟲、蛔蟲、鈎蟲之成蟲及蟲卵有特效之驅蟲劑，本藥主成分Mebendazole是最近歐美最常用之廣範圍驅蟲劑，除對鞭蟲有卓越之驅除效果外，對蛔蟲、蟯蟲、鈎蟲，亦能發揮其顯著之驅除能力，同時對此等寄生蟲之蟲卵亦具排除之效果，此乃與其他驅蟲劑相異之處，亦為本藥之優點。

【成分】每公克中含：
Mebendazole 50 mg

- 【特點】
1. 本藥之驅蟲作用係直接阻斷感染寄生蟲之葡萄糖吸收而即刻耗盡其生活能力，進而不能生存而死亡。本藥在體內僅微少部份由胃腸吸收，由糞中很快的排出體外。
 2. 本藥對腸寄生蟲之單獨感染或混合感染及其蟲卵均有優越得驅除效果。
 3. 本藥對鞭蟲、蛔蟲、鈎蟲、蟲卵之排除有獨到之效果，防止驅蟲後蟲卵在體內再生長成蟲之再感染。
 4. 本藥具良好之耐受性，毒性和副作用極微，人醫常用。
 5. 本藥服用可不受飲食時間限制，不需禁食，亦勿需使用瀉劑。

- 【適應症】
1. 動物體內蟯蟲、鞭蟲、蛔蟲、鈎蟲的感染預防。
 2. 滅絕體內遷移性幼蟲和蟲卵。
 3. 防止動物肺部因幼蟲移行所造成的損害。
 4. 防止體內寄生蟲移行迷路而造成各臟器的損害。
 5. 對於雞、火雞（不含產蛋中之蛋雞）之Ascaridia Capillaria Syngamus，羊之Strongylodes等幼蟲皆有效。

- 【用法·用量】
- 豬：乳豬或四個月內仔豬（50公斤以下）者，每100公斤乾飼料添加本藥60公克，使用五天。
- 種豬：每100公斤乾飼料添加本藥60公克，使用十天。
- 犬、貓、馬、牛、羊：短期治療—100公斤乾飼料添加本藥30公克，連用二天。
長期治療—100公斤乾飼料添加本藥6公克，連用十天。
- 兔、鹿：短期治療—100公斤乾飼料添加本藥30公克，連用二天。
長期治療—100公斤乾飼料添加本藥6公克，連用十天。
- 雞、火雞（不含產蛋中之蛋雞）：短期治療—100公斤乾飼料添加本藥240公克，連用十四天。

- 【注意事項】
1. 飼料在添加本藥時要混合均勻，若混合不均，易造成稀軟糞便現象，但可自行痊癒。
 2. 本藥品由飼主、畜禽水產養殖業者或飼料廠依獸醫師（佐）處方使用。
 3. 雞16週齡以上不得使用，產蛋中之蛋雞不得使用。
 4. 停藥期：7天。
 5. 製造批號、日期及有效期限：請詳見本產品外包裝上之標示。

【包裝】30公克, 60公克, 500公克, 600公克, 1公斤。

本製造廠通過台灣檢驗科技股份有限公司(SGS Taiwan Ltd.) ISO 9001認證



永鴻國際生技股份有限公司

地址：台北市松山區民權東路三段181號12樓

永鴻國際生技股份有限公司 新竹廠

地址：新竹縣新豐鄉中崙村中崙290之3號

電話：(03)6216688