

動物用散劑	抗生素製劑	__g/kg LCP
【適應症】 豬：治療豬赤痢。 雞 (不含產蛋中之蛋雞)：治療壞死性腸炎。 【用法-用量】 豬：每公升飲水添加相當於56mg Lincomycin(力價)，連續最多投予10天。 雞 (不含產蛋中之蛋雞)：每公升飲水添加相當於16.9mg Lincomycin(力價)，連續使用7天。 【停藥期】 豬1天、雞2天。 【儲存條件】 室溫儲存。 本製造廠通過台灣檢驗科技股份有限公司(SGS Taiwan Ltd.) ISO 9001認證 動物藥製字第08093號	“永鴻” 林可黴素-400 散 LINCOMYCIN-400 Powder 每公克中含有： Lincomycin Hydrochloride 400mg (potency)	【注意事項】 1. 本藥品由飼主、畜禽水產養殖業者或飼料廠依獸醫師（佐）處方使用。 2. 本藥添加於飲水中宜當日內使用，雞16週齡以上不得使用、產蛋中之蛋雞不得使用及不可用於體重超過110kg之豬隻。 3. 本藥禁用於兔、天竺鼠、馬及反芻動物。 4. 豬：投藥2天後赤痢症狀未見改善（水樣、黏液樣及血樣下痢），應停止使用。偶而投藥2天內，豬會發生軟便、下痢或肛門腫脹；偶而發生皮膚發紅和刺激性行為，這種現象不需停藥，5-8天內會自行消失恢復。請在有效期限內使用。 製造批號、日期及有效日期如外包裝標示
 		永鴻國際生技股份有限公司 公司地址：台北市松山區民權東路三段181號12樓 新竹廠：新竹縣新豐鄉中崙村中崙290之3號 電話：(03)6216688