

安喜[®] 乾粉注射劑

API
動物藥製字 第05779號

動物用注射劑 (乾粉注射劑)

Ampicin[®] Injection

安喜乾粉注射劑含主成分Ampicillin係為一廣效性青黴素製劑，其對於革蘭氏陽性菌及陰性菌具有抗菌作用。Ampicillin無刺激性，在血液中僅有少部份與血清蛋白質結合。

【成份】每Vial中含有：Ampicillin Sodium 1.0g or 2.0g or 5.0g or 12.5g(potency)

【特點】

1. 本藥對革蘭氏陽性菌及革蘭氏陰性菌具有抗菌作用。
2. 本藥對革蘭氏陰性菌之抗菌作用優於Penicillin G而類似於四環素類，特別是對*Haemophilus* (嗜血桿菌)、*Salmonellae* (沙門氏桿菌) 與*Escherichia coli* (大腸桿菌) 等具有抗菌效果，而對革蘭氏陽性菌之抗菌作用則與Penicillin G約相同。

【適應症】

牛、豬：
治療Ampicillin感受性菌所引起之諸疾患，如肺炎、支氣管炎、腸炎、細菌性下痢、腹膜炎、敗血症、關節炎、子宮內膜炎、乳房炎、產褥熱、化膿症。
豬：
治療豬丹毒。

【用法用量】

牛、豬：3~10mg/kg，肌注或皮下，一天一次，重症時使用上述劑量之倍量或以一天兩次投藥。
以注射用蒸餾水溶解後施行皮下或肌肉注射3~5天。

【注意事項】

1. 本藥不可連續使用7天以上。
2. 使用本藥偶會發生休克症狀或過敏症狀，故投藥前應先調查使用經歷或施行反應試驗，反應陽性者避免投藥。
3. 使用本藥偶會發生局部作用。
4. 本藥可與Prednisolone或Dexamethasone等腎上腺皮質素合用，其劑量與各該劑單獨使用劑量相同。
5. 停藥期—牛、豬：5天，牛乳：72小時。

本處方藥品限由執業獸醫師(佐)監督之下使用

【包裝規格】1.0g/vial, 2.0g/vial, 5.0g/vial, 12.5g/vial

產品批號、製造日期及有效日期請見瓶身標示

本製造廠通過台灣檢驗科技股份有限公司(SGS Taiwan Ltd.) ISO 9001認證

vetnostrum

永鴻國際生技股份有限公司

VETNOSTRUM ANIMAL HEALTH CO., LTD.

新竹廠：新竹縣新豐鄉中崙村中崙290之3號 | (03) 621 6688

產品編號：432001010

217514843

