

CQI

動物藥製字 第08914號

動物用注射劑 (滅菌懸劑)

# 賜來好<sup>®</sup> 滅菌懸浮液 2.5%

## Grantfine<sup>®</sup> Injection 2.5%

頭孢子菌素類(Cefquinome)為廣效殺菌性的抗生素，適用於牛隻與豬隻細菌感染，即對Cefquinome具感受性之革蘭氏陽性及陰性菌具有良好治療效果。

【成分】每毫升(mL)中含有: Cefquinome (Sulfate) ..... 25 mg (potency)

### 【特點】

1. 本藥是動物專用之新型廣效性抗生素，故殆無誘發抗藥性菌之虞。
2. 本藥抗菌範圍廣泛，對絕大多數的革蘭氏陽性及陰性細菌引起之混合感染症，具有優越的殺菌效果。
3. 本藥使用劑量少，作用強，且療效迅速。
4. 本藥毒性低、安全性高，殆無副作用。

### 【適應症】

犢牛：大腸桿菌性敗血症

- 牛：
1. 治療由Pasteurella multocida、Mannheimia haemolytica造成之肺臟與呼吸道感染。
  2. 蹄趾皮膚炎、感染性蹄趾壞死(腐蹄病)、急性趾間壞死桿菌症(蹄葉炎)。
  3. 全身性症狀之急性大腸桿菌性乳房炎。

仔豬：1. 減少Streptococcus suis引起腦膜炎死亡。

2. 治療Streptococcus spp.、E. coli及其他對Cefquinome具感受性微生物所引起關節炎。
3. 治療因Staphylococcus hyicus所引起之滲出性皮膚炎(輕度或中度改變)。

- 豬：
1. 治療由Pasteurella multocida、Haemophilus parasuis、Actinobacillus pleuropneumoniae、Streptococcus suis及其他對Cefquinome具感受性微生物所引起肺臟、呼吸道感染。
  2. 治療由E. coli、Streptococcus spp.及其他對Cefquinome具感受性微生物所引起乳房炎-子宮炎-無乳症(MMA)。

### 【用法用量】肌肉注射

犢牛：大腸桿菌性敗血症，2 mg/kg (4 mL/50 kg體重)，一天一次，連續3-5天。

- 牛：
- 全身性症狀之急性大腸桿菌性乳房炎，1 mg/kg (2 mL/50 kg體重)，一天一次，連續2天；  
由Pasteurella multocida及Mannheimia haemolytica引起之呼吸道感染，蹄趾皮膚炎、感染性蹄趾壞死(腐蹄病)、急性趾間壞死桿菌症(蹄葉炎)，1 mg/kg (2 mL/50 kg體重)，一天一次，連續3-5天。

仔豬：腦膜炎/關節炎/表皮炎，2 mg/kg (2 mL/25 kg體重)，一天一次，連續5天。

- 豬：
- 呼吸道感染 2 mg/kg (2 mL/25 kg體重)，一天一次，連續3天；  
乳房炎-子宮炎-無乳症(MMA) 2 mg/kg (2 mL/25 kg體重)，一天一次，連續2天。

### 【停藥期】

牛：食用部位：5日，乳汁：1日。

豬：食用部位：3日。

### 【注意事項】

1. 本藥請於25°C以下、避光儲存，開封後四週內使用完畢。
2. 本藥勿投予低於1.25 kg之動物。
3. 對β-lactam類抗生素過敏時，避免使用本藥。
4. 使用前需將懸浮注射液搖晃均勻。

本處方藥品限由執業獸醫師(佐)監督之下使用。

【包裝規格】100 毫升瓶裝

產品批號、製造日期及有效日期請見瓶身標示

本製造廠通過台灣檢驗科技股份有限公司(SGS Taiwan Ltd.) ISO 9001認證

Vetnstrum

永鴻國際生技股份有限公司

VETNOSTRUM ANIMAL HEALTH CO., LTD.

台北市松山區民權東路三段181號12樓 | 02-2718-6200

新竹廠：新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號

產品編號：432004010

217515142





# 賜來好®

滅菌懸浮液2.5% Grantfine® Injection 2.5%

第四代頭孢子菌素類抗生素主要作用為抑制細菌細胞壁合成。

- ① 對革蘭氏陽性及陰性菌具有良好殺菌效果。
- ② 對豬及牛之細菌性呼吸道疾病與腸炎有卓越的治療效果。
- ③ 可通過腦脊髓液及關節囊液，有效處理腦膜炎及關節炎造成之患疾。

## 產品特點

### ● 抗菌效果廣泛

- 第四代頭孢子素抗生素
- 殺菌範圍廣
- 效果確實

### ● 用量省

- 劑量少
- 作用強
- 療效迅速

### ● 毒性低

- 安全性高
- 抗藥性低
- 無副作用

### ● 組織分佈廣

- 半衰期長
- 藥物可達腦脊髓液與關節囊液，讓細菌無處可逃。



# 賜來好® 滅菌懸浮液 2.5%

# Grantfine® Injection 2.5%

成分 每ml中含有:Cefquinome (Sulfate) ..... 25mg

## 建議使用方法

## 建議使用劑量 (每天一次)

品種	適應症	體重(Kg)	劑量(ml)	治療期間(天)
牛	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 呼吸道疾病 巴斯德桿菌 <i>Mannheimia haemolytica</i>, <i>Histophilus somni</i></li> </ul> 	50	2	3-5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 蹄趾炎 蹄趾壞死(腐蹄病)、急性趾間壞死桿菌症(蹄葉炎)</li> </ul>	50	2	3-5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 急性大腸桿菌性乳房炎 大腸桿菌 金黃色葡萄球菌 異乳鏈球菌 無乳鏈球菌 乳房鏈球菌</li> </ul> 	50	2	2
仔豬	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 腦膜炎/關節炎 第二型豬鏈球菌、大腸桿菌 及鏈球菌屬引起之症狀</li> </ul> 	10	0.8	5
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 滲出性皮炎 葡萄球菌引起之症狀</li> </ul> 			
豬	治療由巴斯德桿菌、豬嗜血桿菌、放線桿菌胸膜肺炎、第二型豬鏈球菌所引起肺臟、呼吸道感染。	50	4	3
	由大腸桿菌、鏈球菌屬具感受性微生物所引起乳房炎-子宮炎-無乳症(MMA)	50	4	2

包裝 100ml

## 注意事項

- 本藥請勿投予體重低於1.25kg之動物。
- 對β-lactam類抗生素過敏時，避免使用本藥。
- 使用前需將本藥搖晃均勻。
- 停藥期：牛 - 食用部位：5日，乳汁：1日。豬 - 食用部位：3日。