

EFI
動物藥製字 第07579號

動物用注射劑 (注射劑)

炎服樂® 注射液

Enflosin® Injection

自1962年發現nalidixic acid具有顯著之抗菌活性以來，4-quinolone類抗菌劑應用於抗
菌性化學療法已有將近30年的歷史。經過醫藥界不斷的改良與研究發現，在quinolone之
母核上導入氟原子，不但可增加quinolone之抗菌活性，且可使抗菌譜更加寬廣，而其
中第一個被應用於動物醫療使用之fluoroquinolone便是Enrofloxacin，其乃專為動物設
計之人工合成抗菌劑，而不同於一般由真菌或微生物分離出來之抗生素製劑。

【成份】

每毫升(mL)中含有：Enrofloxacin 50mg

【特點】

1. 本藥與其它對細菌細胞壁或細胞質核酸體起作用之抗菌劑或抗生素不同點為，
Enrofloxacin可直接於細菌之核心發揮作用，抑制DNA gyrase之活性，進而使DNA無
法複製，並迅速導致病原菌的死亡。
2. 本藥具廣泛之抑菌範圍而由研究顯示，Enrofloxacin對各種革蘭氏陽性菌、革蘭氏陰
性菌、微漿菌，甚至其它多樣化之抗藥性菌株均具有敏感性。
3. 由於本藥具有寬廣之抗菌譜，故可用於下列諸病症之治療：
牛：由細菌感染所引起的呼吸器及消化道疾病(巴氏桿菌症、微漿菌症、大腸菌症、大腸菌性
敗血症、沙氏桿菌症)以及由病毒感染後所引起的二次感染。
豬：呼吸道或消化道感染(巴氏桿菌症、微漿菌症、大腸菌下痢、大腸菌性敗血症、沙氏桿菌症)。
複雜性疾病如萎縮性鼻炎，地方性肺炎及MMA徵候群等。

【適應症】

牛、豬：治療由革蘭氏陽性菌、革蘭氏陰性菌及微漿菌引起的感染症。

【用法用量】

一般對於牛（體重至250公斤）及豬，每10公斤體重注射0.5毫升。如果是嚴重的呼吸道感
染或沙氏桿菌症，劑量可增加到每10公斤體重注射1.0毫升。牛用皮下注射，豬用肌肉注
射。注射時要打在一般注射的部位，豬打在前頸肌肉。牛注射時，每注射部位不要超過
10毫升，而豬不要超過2.5毫升。牛及豬一般治療3天，而沙氏桿菌症則治療5天。

【注意事項】

1. 馬：禁止使用。
2. 停藥期：8天。
3. 請在有效期限內使用。

【包裝規格】100毫升瓶裝

產品批號、製造日期及有效日期請見瓶身標示

本處方藥品限由執業獸醫師(佐)監督之下使用

本產品適應症、建議使用方式、禁忌症、警語、儲存條件及相關注意事項，請詳閱
附單內容

本製造廠通過台灣檢驗科技股份有限公司(SGS Taiwan Ltd.) ISO 9001認證



永鴻國際生技股份有限公司
VETNOSTRUM ANIMAL HEALTH CO., LTD.

新竹廠：新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號

產品編號：431020010(EFI)

217516843

