

IWI10
動物藥製字 第07273號

動物用注射劑 (注射劑)

新鐵血旺® 注射液10%

Ironwon® Injection 10%

貧血症狀的產生，可說是鐵的缺乏，因為鐵是血紅素及酵素的主要成分。雖然很少仔豬生下來就貧血的，不過，仔豬因為肝中鐵的貯存量低，而且出生時也缺乏保留的血紅素，所以對鐵分的需求很需要。由於母豬乳汁鐵分來源不多，如果不供給仔豬外來的鐵分，很快地便會發生貧血症，如此會造成豬的機能障礙，粘膜蒼白，皮毛粗糙，發育緩慢，身體虛弱，缺少疾病抵抗力，終於死亡，造成經濟上的重大損失。

本藥是由低分子葡萄聚糖與膠狀氫氧化鐵之複合物配合高單位之維他命B12製成的新型補血滋養劑。具足夠穩定度，且能耐組織中的pH值，滲透壓類似體內組織，故吸收迅速，藥效持久，而能達到優越的效果。

【成份】每毫升(mL)中含有：

Iron Dextran Powder equivalent to Iron	100mg
Cyanocobalamin	80mcg

【特點】

1. 本藥藥性安定持久，無副作用，仔豬生後3~10日，只需注射1mL，則有理想效果。
2. 本藥除了對預防及治療仔豬貧血有特別功效外，且可增加疾病之抵抗力，減少早期的死亡率。

【適應症】

仔豬、牛、馬：預防與治療貧血。

【用法用量】

仔豬：生後3~10日，於後腿肌肉深部注射1mL。重症者，每週注射1mL，連續2~3次。

牛、馬：每次2~3mL，隔日或數日肌注一次，直至症狀改善為止。

【注意事項】

1. 本藥遇酒精產生沈澱，請使用煮沸消毒之注射器。若用酒精消毒者，待乾燥後方可使用。
2. 仔豬注射時，請使用5/8吋20號之注射針頭。注射部位清潔及消毒後，用拇指按住該部並向旁斜推，拉緊皮膚，以垂直方向，將注射針插入後腿肌肉後，將藥液注入，注射完後，拔出針頭，放鬆拇指壓力，使注射部位皮膚回到原來位置。
3. 本藥應貯於冷暗處，不可受日光直射。
4. 請在有效期限內使用。

本處方藥品限由執業獸醫師(佐)監督之下使用

【本產品適應症、建議使用方式、禁忌症、警語、儲存條件及相關注意事項，請詳閱仿單內容】

【包裝規格】20、50、100毫升瓶裝

產品批號、製造日期及有效日期請見瓶身標示

本製造廠通過台灣檢驗科技股份有限公司(SGS Taiwan Ltd.) ISO 9001認證



永鴻國際生技股份有限公司

VETNOSTRUM ANIMAL HEALTH CO., LTD.

新竹廠：新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號 | 03 621-6688

產品編號 : 431008010

