

力霸全場 雙肥聯手

力肥[®] 注射液

動物藥製字
第08350號

Lincomycin 對常見之革蘭氏陽性菌、厭氣桿菌屬 (*Bacteroides spp.*) 及
黴漿菌屬 (*Mycoplasma spp.*) 等具有抗菌作用。

Spectinomycin 為對革蘭氏陽性菌及陰性菌具有顯著抗菌作用。

兩種抗生素併用能產生協同作用而發揮超廣效性之抗感染效能，治療各
種具有感受性細菌引起之感染症。

Licofat[®]

150H Injection

力肥[®] 注射液Licofat[®] 150H Injection

成分	Lincomycin Hydrochloride.....50mg(Potency) Spectinomycin Hydrochloride.....100mg(Potency)
適應症	豬 - 治療葡萄球菌症、鏈球菌症、豬丹毒、大腸桿菌症、傳染性關節炎、黴漿菌性肺炎。 雞(不含產蛋中之蛋雞) - 治療慢性呼吸器病、傳染性鼻炎、家禽霍亂、細菌性肺炎、咽喉炎、支氣管炎、腸炎與葡萄球菌症。
用法用量	豬 - 每10公斤體重肌肉注射本藥1mL，一天一次，視病程需要可注射3至5天。 雞(不含產蛋中之蛋雞) - 每0.5公斤體重皮下注射本藥0.1mL，每天一次，連續注射3天。
包裝	100mL
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> • 本處方藥品限由執業獸醫師(佐)監督之下使用。 • 雞16週齡以上不得使用，產蛋中之蛋雞不得使用。 • 停藥期：21天 • 本藥請儲存於2~8°C冷藏。



力霸全場 雙肥聯手

林可黴素

觀黴素

革蘭氏陽性菌

螺旋體

黴漿菌

革蘭氏陰性菌

本藥係配合Lincomycin與Spectinomycin兩種抗生素，
相輔相成的抗菌效用製成的抗生素針劑。



建議使用方法與時機

呼吸道疾病

家禽慢性呼吸道疾病 (CRD)

病原：*Mycoplasma gallisepticum*

主要感染雞和火雞，好發年齡為數周齡至18月齡以上。

臨床症狀

- 1 症狀多為呼吸道症狀，如：咳嗽，濕性鑼音，鼻涕，流鼻涕及眼淚，嚴重時會開口呼吸，偶發單側下竇腫脹。(圖1)



(圖1)

- 2 易與大腸桿菌或IB混合感染，造成氣囊炎，肝包膜炎或心囊炎等。(圖2)



(圖2)

- 3 易會造成關節腫脹及跛行。(圖3)



(圖3)

使用方法

因應場內控制呼吸道困擾，建議群體使用力肥[®]治療並於飲水中添加太郎[®]散或伏菌[®]散，迅速控制CRD之情形

豬黴漿菌肺炎

病原：*Mycoplasma pneumoniae*

主要影響生長或肥育豬隻造成咳嗽症狀。

臨床症狀

- 1 與其他病原的共同感染 (PRRSV, PCV2 或 *Pasteurella multocida*) 會增加肺炎黴漿菌所造成肺炎的嚴重程度。(圖4)



(圖4)

- 2 黴漿菌性肺炎造成的病變是慢性的，肉眼可見肺臟前腹葉變實，病灶外觀從深紫色到灰褐色。(圖4、5)



(圖5)

使用方法

推薦使用力肥[®]治療，並於飲水中搭配添加太郎[®]散或咳龍[®]散，或在飼料中搭配添加泰好用[®]，以控制黴漿菌肺炎之情形

消化道疾病

豬赤痢

病原：*Brachyspira hyodysenteriae*

主要好發於15~70公斤的生長肥育豬，離乳豬與母豬亦可能發病。

臨床症狀

- 1 病豬初期排出淡黃色至灰白色軟便，隨病程進展，病豬排出混以黏液或血液的下痢便。(圖a)



(圖a)

- 2 長期下痢，糞便含纖維蛋白，虛弱、脫水、消瘦、口渴、行動失調，病變侷限在結腸，盲腸與直腸，腸管充血水腫，腸繫淋巴腫大。(圖b)



(圖b)

- 3 少數豬隻因甚急性感染，大約在感染後數小時內死亡。(圖c)



(圖c)

使用方法

建議以力肥[®]治療3-5天，同時於飼料中添加咳龍[®]散與肥肥酸[®] AP / 勇又強[®]，調整腸道菌相平衡，控制壞菌增殖問題

增生性迴腸炎

病原：*Lawsonia intracellularis*

主要好發肥育豬或上市肉豬，成豬與新母豬亦會發生。

臨床症狀

- 1 症狀上病豬對飼料有與趣卻不吃料，嚴重程度不一。
- 2 急性時，貧血症狀。慢性時，排黑色焦油狀便。(圖d)



(圖d)

- 3 有些豬未見排便異常，只是較蒼白與失重。懷孕母豬有時會流產。
- 4 多數罹病豬隻會自然痊癒，但部分會發展成慢性腸炎，偶有黑便或糞便帶血。(圖e、f)



(圖e)



(圖f)

使用方法

搭配用藥計劃使用，發病欄中群體等以力肥[®]治療3-5天，飼料或飲水中添加太郎[®]散或咳龍[®]散，也可搭配使用 肥肥酸[®] AP/勇又強[®]，調整腸道菌相並降低壞菌增殖問題

力肥® 150H

LEI
動物藥製字 第08350號
動物用注射劑 (注射劑)

LICOFAT® 150H

本藥係配合Lincomycin與Spectinomycin兩種抗生素相輔成的抗菌作用而製成的抗生素製劑。其具有Lincomycin與Spectinomycin的雙重抗菌功效。

【成份】每毫升(mL)中含有：
Lincomycin Hydrochloride..... 50mg(Potency)
Spectinomycin Hydrochloride..... 100mg(Potency)

【特點】

1. Lincomycin為Streptomycin lincolnensis所產生的一種抗生素，其對常見之革蘭氏陽性菌、厭氣桿菌屬(Bacteroides spp.)及微漿菌屬(Mycoplasma spp.)等具有抗菌作用。
2. Spectinomycin為Streptomyces flavopersicus所產生的抗生素，其對革蘭氏陽性菌及陰性菌具有顯著抗菌作用。
3. Lincomycin與Spectinomycin兩種抗生素併用能產生協同作用而成為發揮廣效性之抗感染效能。
4. 本藥可治療各種具有感受性細菌引起之感染症。

【適應症】

豬：治療葡萄球菌症、鏈球菌症、豬丹毒、大腸桿菌症、傳染性關節炎、微漿菌性肺炎。
雞（不含產蛋中之蛋雞）：治療慢性呼吸器病、傳染性鼻炎、家禽霍亂、細菌性肺炎、咽喉炎、支氣管炎、腸炎與葡萄球菌症。

【用法用量】

豬：每10公斤體重肌肉注射本藥1mL，每天一次，視需要可注射3至5天。
雞(不含產蛋中之蛋雞)：每0.5公斤體重皮下注射本藥0.1mL，每天一次，連續注射3天。

【注意事項】

1. 禁用於曾對此二種抗生素有過敏之禽畜。
2. 使用本藥期間若出現酵母菌之過度生長或重覆感染時，應做其他適當的治療。
3. 雞16週齡以上不得使用，產蛋中之蛋雞不得使用。
4. 停藥期：21天。
5. 本藥請儲存於2~8°C冷藏。
6. 請在有效期間內使用。

本處方藥品限由執業獸醫師(佐)監督之下使用

請冷藏保存，確保品質，冷藏品售出，概不退貨。

【本產品適應症、建議使用方式、禁忌症、警語、儲存條件及相關注意事項，請詳閱仿單內容】

【包裝規格】100毫升瓶裝

產品批號、製造日期及有效日期請見瓶身標示

本製造廠通過台灣檢驗科技股份有限公司(SGS Taiwan Ltd.) ISO 9001認證

 vetnostrum

永鴻國際生技股份有限公司
VETNOSTRUM ANIMAL HEALTH CO., LTD.
台北市松山區民權東路三段181號12樓 | 02-2718-6200
新竹廠：新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號
產品編號：431006010 217514142

