

# 立可治® 長效注射液30%

LKI

動物藥製字 第08820號

動物用注射劑 (注射劑)

## Likerjyh® Injection 30%

氟甲磺氯黴素(Florfenicol)屬於合成廣效性抗生素，由氯黴素類所衍生之新一代抗生物質，在化學結構式上去除氯黴素原來的對硝基群(-NO<sub>2</sub>)，克服了氯黴素原來的副作用，另外以氟取代第三個碳上的羥基(-OH)，使細菌乙醯化作用被阻斷，不但降低抗藥性菌產生，並提高抗菌活性，具有良好生物利用率，組織分佈率與抗菌範圍亦比氯黴素廣；針對革蘭氏陽性菌、革蘭氏陰性菌、立克次體、嗜血桿菌及放線桿菌等具有顯著之抑菌效果，普遍應用在禽類、豬及牛的疾病治療；符合農場為禽畜疾病治療時之需求，並有助於維護肉品公共衛生安全。

【成份】每毫升(mL)中含有：Florfenicol ..... 300mg

### 【特點】

氟甲磺氯黴素具速效、長效的特點，注射吸收快，半衰期長，在體內能維持較長時間的有效血液濃度，不引起骨髓抑制或再生障礙性貧血。

### 【適應症】

牛、豬：治療因巴斯德桿菌、嗜血桿菌、微漿菌、豬胸膜肺炎放線桿菌所引起的呼吸道感染。  
土番鴨(不含產蛋中之蛋鴨)：治療水禽雷氏桿菌之感染症。

### 【用法用量】

牛：肌肉：每15kg注射本藥1mL(即推薦用量20mg/kg)，注射2劑，間隔48小時。  
皮下：每15kg注射本藥2mL(即推薦用量40mg/kg)。  
豬：肌肉：每20kg注射本藥1mL(即推薦用量15mg/kg)，注射2劑，間隔48小時，限由頸部注射。  
土番鴨(不含產蛋中之蛋鴨)：每公斤體重投予劑量40mg，每天1次，連續使用5天。  
本藥每一注射部位注射劑量不得超過10mL。應使用16號針頭進行注射。

### 【注意事項】

1. 請儲存於25°C以下。
2. 本藥不可冷凍，開封後應於四週內用畢。
3. 本藥不適用於種畜，因使用於繁殖種畜尚未經研究。
4. 本藥勿使用於分娩前2個月妊娠牛、泌乳期或乾乳期之乳牛。
5. 本藥於治療期間會發生短暫腹瀉，療程結束即迅速恢復。
6. 本藥於注射處發生之輕微發炎現象約2~3週完全消失。
7. 繁殖及妊娠種畜結果尚未研究，如需使用本藥，應經獸醫師風險評估方可使用。

本處方藥品限由執業獸醫師(佐)監督之下使用

### 【停藥期】

肉用牛：肌肉注射(20mg/kg, 2次), 30天。  
皮下注射(40mg/kg, 1次), 44天。  
乳牛：泌乳期間禁止使用。  
肉豬、土番鴨：14天。

【包裝規格】50, 100, 250 毫升瓶裝

產品批號、製造日期及有效日期請見瓶身標示

本製造廠通過台灣檢驗科技股份有限公司(SGS Taiwan Ltd.) ISO 9001認證

Vetnstrum

永鴻國際生技股份有限公司

VETNOSTRUM ANIMAL HEALTH CO., LTD.

台北市松山區民權東路三段181號12樓 | 02-2718-6200

新竹廠：新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號

產品編號：431011010

217514542





# 立可治®

## 長效注射液 30%

動物藥製字 第08820號

# Florfenicol

## Injection 30%



 **vetnostrum**

# 產品特點

## 氟黴素類抗生素中，抗菌效果最佳者

作用機制:干擾細菌蛋白質合成導致細菌死亡。

- ★ 快速:迅速且持久的藥理作用，在體內2小時即可達到最高濃度，且可維持18小時藥物效果。
- ★ 強效:含氟化學結構，增強抗菌效果。
- ★ 高脂溶性:迅速進入血腦屏障，達到全面療效。

### 立可治® 長效注射液 30% Likerjyh® Injection 30%

成分	Florfenicol ..... 300mg (Potency)																													
適應症	<p>牛、豬 - 治療因巴斯德桿菌、嗜血桿菌、黴漿菌、豬胸膜肺炎放線桿菌所引起的呼吸道問題。</p> <p>土番鴨(不含產蛋中之蛋鴨) - 治療水禽雷氏桿菌感染症。</p>																													
用法用量	<p>牛 - 每15kg肌肉注射本藥1ml, 注射兩劑, 間隔48小時。每15kg皮下注射本藥2ml。</p> <p>豬 - 每20kg肌肉注射本藥1ml, 注射兩劑, 間隔48小時。</p> <p>土番鴨(不含產蛋中之蛋鴨) - 每公斤體重40mg的Florfenicol, 每日一次, 連續使用5天。</p>																													
	<p><b>豬 體重 - 用量速算表</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>體重 (kg)</th> <th>劑量 (mL)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>20</td><td>1</td></tr> <tr><td>40</td><td>2</td></tr> <tr><td>60</td><td>3</td></tr> <tr><td>80</td><td>4</td></tr> <tr><td>100</td><td>4</td></tr> <tr><td>120</td><td>8</td></tr> </tbody> </table>	體重 (kg)	劑量 (mL)	20	1	40	2	60	3	80	4	100	4	120	8	<p><b>牛 體重 - 用量速算表</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>體重 (kg)</th> <th>劑量 (mL)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>60</td><td>4</td></tr> <tr><td>120</td><td>8</td></tr> <tr><td>180</td><td>12</td></tr> <tr><td>240</td><td>16</td></tr> <tr><td>300</td><td>20</td></tr> <tr><td>600</td><td>40</td></tr> </tbody> </table>	體重 (kg)	劑量 (mL)	60	4	120	8	180	12	240	16	300	20	600	40
體重 (kg)	劑量 (mL)																													
20	1																													
40	2																													
60	3																													
80	4																													
100	4																													
120	8																													
體重 (kg)	劑量 (mL)																													
60	4																													
120	8																													
180	12																													
240	16																													
300	20																													
600	40																													
包裝	100 mL																													
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 禁用於分娩前2個月妊娠牛、泌乳期或乾乳期之乳牛。如需使用本藥，應經獸醫師風險評估方可使用。</li> <li>• 停藥期：肉用牛 - *肌肉注射:30天。*皮下注射:44天。 乳牛 - 泌乳期間禁止使用。 肉豬、土番鴨 - 14天。</li> </ul>																													

