

立可治® 長效注射液30%

動物用注射劑 (注射劑)

Likerjyh® Injection 30%

氟甲磺氯黴素(Florfenicol)屬於合成廣效性抗生素,由氯黴素類所衍生之新一代抗生物質,在化學結構式上去除氯黴素原來的對硝基群(-NO₂),克服了氯黴素原來的副作用,另外以氟取代第三個碳上的羥基(-OH),使細菌乙酰化作用被阻斷,不但降低抗藥性菌產生,並提高抗菌活性,具有良好生物利用率,組織分佈率與抗菌範圍亦比氯黴素廣;針對革蘭氏陽性菌、革蘭氏陰性菌、立克次體、嗜血桿菌及放線桿菌等具有顯著之抑菌效果,普遍應用在禽類、豬及牛的疾病治療;符合農場為禽畜疾病治療時之需求,並有助益於維護肉品公共衛生安全。

【成份】每毫升(mL)中含有: Florfenicol 300mg

【特點】

氟甲磺氯黴素具速效、長效的特點,注射吸收快,半衰期長,在體內能維持較長時間的有效血液濃度,不引起骨髓抑制或再生障礙性貧血。

【適應症】

牛、豬: 治療因巴斯德桿菌、嗜血桿菌、黴漿菌所引起的呼吸道感染。
豬: 治療豬胸膜肺炎放線桿菌所引起的呼吸道感染。
土番鴨(不含產蛋中之蛋鴨): 治療水禽雷氏桿菌之感染症。

【用法用量】

牛: 肌肉: 每15kg注射本藥1mL(即推薦用量20mg/kg), 注射2劑, 間隔48小時。
皮下: 每15kg注射本藥2mL(即推薦用量40mg/kg)。
豬: 肌肉: 每20kg注射本藥1mL(即推薦用量15mg/kg), 注射2劑, 間隔48小時, 限由頸部注射。
土番鴨(不含產蛋中之蛋鴨): 每公斤體重投予劑量40mg, 每天1次, 連續使用5天。
本藥每一注射部位注射劑量不得超過10mL。應使用16號針頭進行注射。

【注意事項】

1. 請儲存於25°C以下。
 2. 本藥不可冷凍, 開封後應於四週內用畢。
 3. 本藥不適用於種畜, 因使用於繁殖種畜尚未經研究。
 4. 本藥勿使用於分娩前2個月妊娠牛、泌乳期或乾乳期之乳牛。
 5. 本藥於治療期間會發生短暫腹瀉, 療程結束即迅速恢復。
 6. 本藥於注射處發生之輕微發炎現象約2~3週完全消失。
 7. 繁殖及妊娠種畜結果尚未研究, 如需使用本藥, 應經獸醫師風險評估方可使用。
- 本處方藥品限由執業獸醫師(佐)監督之下使用

【停藥期】

肉用牛: 肌肉注射(20mg/kg, 2次), 30天。
皮下注射(40mg/kg, 1次), 44天。
乳牛: 泌乳期間禁止使用。
肉豬、土番鴨: 14天。

【包裝規格】50, 100, 250 毫升瓶裝

產品批號、製造日期及有效日期請見瓶身標示

本製造廠通過台灣檢驗科技股份有限公司(SGS Taiwan Ltd.) ISO 9001認證



永鴻國際生技股份有限公司

VETNOSTRUM ANIMAL HEALTH CO., LTD.

新竹廠: 新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號

產品編號: 431011010

217514543

