

# 多情素<sup>®</sup> 懸浮注射液

LVI  
動物藥製字 第06105號  
動物用注射劑 (滅菌懸劑)

## Lover<sup>®</sup> Injection

國外養豬業者為了講求經濟效率，常常會使用性腺激素及女性荷爾蒙使一群豬同時發情，以便利飼養管理。本省養豬業者也已注意及此一趨勢，本公司有鑒於此，故積極研究開發出此一同時含有絨毛膜性腺激素(Chorionic Gonadotrophin)及動情素 (Estradiol Benzoate)的荷爾蒙製劑，對於母畜之發情有優秀的效果，以適應飼養業者的需要。

【成份】每毫升(mL)油質懸浮液中含有：  
Chorionic Gonadotrophin ..... 250units  
Estradiol Benzoate ..... 1mg

### 【特點】

1. 本藥之Chorionic Gonadotrophin可以促進成熟濾泡的排卵以及促進黃體形成，不但可促進發情，且可延長發情期。
2. 本藥另一主成分Estradiol Benzoate可以促進子宮內膜的增生發育，使得受精卵易於著床於子宮內。
3. 本藥在此兩種主成分作用下，能促進母畜的發情，提高受胎成功率並增加胎數，因而獲得經濟上的利潤。

### 【適應症】

母豬、母牛、母馬：  
不發情或發情異常，排卵異常或無排卵，卵巢機能不全，濾泡囊腫。

### 【用法用量】

1. 母豬每次2mL，母牛每次5mL，母馬每次5~8mL，行皮下或肌肉注射之。
2. 使用前請先充分振盪藥液，使成均一油質懸浮液。  
(請詳閱說明書後使用)

【本產品適應症、建議使用方式、禁忌症、警語、儲存條件及相關注意事項，請詳閱仿單內容】

### 【注意事項】

1. 停藥期5天。
2. 請充分振搖藥液後使用。
3. 請在有效期限內使用。
4. 請冷藏保存並貯存於冷暗處。
5. 注射用針筒不可用酒精消毒，應用煮沸方法。

本處方藥品限由執業獸醫師(佐)使用

請冷藏保存，確保品質，冷藏品售出，概不退貨。

【包裝規格】2、5、10、20毫升瓶裝

產品批號、製造日期及有效日期請見瓶身標示

本製造廠通過台灣檢驗科技股份有限公司(SGS Taiwan Ltd.) ISO 9001認證

vetnostrum

永鴻國際生技股份有限公司  
VETNOSTRUM ANIMAL HEALTH CO., LTD.  
台北市松山區民權東路三段181號12樓 | 02-2718-6200  
新竹廠：新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號  
產品編號：431029010 217515942



# 內分泌製劑 系列

HORMONE



## 給母豬全方位的照護

永齊孕<sup>®</sup> 口服液


依定生<sup>®</sup> 注射液

催生素 注射液

多情素<sup>®</sup> 懸浮注射液

 vetnostrum

# 內分泌製劑系列, 提供 母豬全方位的照護!



永齊孕®  
口服液劑 產品

- 人工合成的助孕酮製劑 (Altrenogest)
- 女豬發情管理利器, 有效預測發情週期
- 豬群同期化發情, 集中管理, 減少差異
- 管控新女豬數量, 減少飼料消耗
- 優化生產流程, 提升牧場生產效能

## 針劑 產品

### 依定生®

分娩同期化  
管理有規劃

- 人工合成的前列腺素製劑 (Cloprostenol)
- 有效溶解黃體, 誘導分娩, 使分娩同期化
- 大部分母豬於注射後約24 - 36小時開始分娩

### 催生素

收縮強有力  
生產不費力

- 化學合成之催產素 (Oxytocin)
- 促進子宮平滑肌收縮, 產生調節作用及刺激乳腺收縮
- 作用快速且強力, 促使胎兒與胎盤排出


### 多情素®

母豬發情穩  
配種不失準

- 促使母畜發情正常, 使發情徵候明顯, 提高配種成功率
- Chorionic Gonadotrophin 使濾泡成熟排卵, 促進黃體形成
- Estradiol Benzoate 促子宮內膜增生發育, 以利受精卵著床

## 永齊孕® 可使用在新女豬發情週期的任何階段

- ✓ 促使不同週期之新女豬/後備母豬發情同期化。
- ✓ 每天一次, 連續餵食18天, 讓豬群的生理狀態相近。
- ✓ 停止餵食後4-7天, 豬群進入發情期。



# 內分泌製劑



動物藥製字 第09502號

## 永齊孕® 口服液 Oestrufix® Oral solution

**成分:**每毫升含有Altrenogest 4mg

**用法用量:**每隻動物每天給予20mg之 Altrenogest (相當於本藥5毫升), 直接伴糧食用, 連續使用18天。

**停藥期:**9天。

- 注意事項:**
- ① 若重複性意外地接觸並吸收本藥, 會導致月經週期混亂、子宮或下腹部痙攣、增加或減少子宮出血, 懷孕時間延長或頭痛。
  - ② 若已知會對主成分過敏, 應避免接觸本產品。

## 依定生® 注射液 Regubirth® Injection

**成分:**每毫升含有Cloprostenol Sodium B.P. (Vet) 92µg (相當Cloprostenol 87.5µg)

**用法用量:**每頭母豬使用劑量為2ml, 以肌肉深部注射。

**停藥期:**注射本劑24小時內之母豬, 請勿屠宰供人食用。

- 注意事項:**
- ① 太早注射將使小豬早產無法育成, 即在平均分娩前3日(含)注射時, 可能增加不能育成之仔豬數。
  - ② 本藥可經由皮膚吸收, 具有生育年齡、懷孕婦女及氣喘病患者避免接觸, 因意外濺及皮膚時, 應立刻用清水洗乾淨。若因意外吸入或注射本劑引致呼吸困難時, 應使用速效型之支氣管擴張劑(如Isoprenaline 或 Salbutamol) 治療。



動物藥製字 第08334號

## 催生素 注射液 Kistocin® Injection

**成分:**每毫升含有Oxytocin 10 units

**用法用量:**行皮下或肌肉注射。

豬: 每次1-3ml。 牛、馬: 每次1-4ml。 犬: 每次0.2-1ml。 貓: 每次0.2-0.5ml。

(應在母畜的子宮頸管已擴張後才施打, 否則容易導致子宮破裂。)



動物藥製字 第07037號

## 多情素® 注射液 Lover® Injection

**成分:**每毫升含有Chorionic Gonadotrophin 250 units ; Estradiol Benzoate 1mg

**用法用量:**行皮下或是肌肉注射, 使用前請充分震盪混合藥液, 使成均一油質懸濁液。

母豬: 每次2ml/每頭。 母牛: 每次5ml/每頭。 母馬: 每次5-8ml/每頭。

(注射本藥3天內, 勿重複注射。)

**停藥期:**5天。

**注意事項:**請充分振搖藥液後使用。



動物藥製字 第06105號