

EarTon

耳永通

Each mL contains

Hydrocortisone aceponate (HCA) 1.11 mg
Miconazole as nitrate 15.1 mg
Gentamicin as sulphate 1505 IU

適應症

犬 - 治療急性外耳炎和對慶大黴素(gentamicin)敏感之細菌性及對咪康唑(miconazole)敏感之黴菌性急性惡化性重複性外耳炎;尤其是皮膚芽胞菌(*Malassezia pachydermatis*)。

禁忌症

1. 請勿使用於對主成份或賦形劑、皮質類固醇、唑類(azole)抗黴菌劑、胺基配醣體類(aminoglycosides)藥物過敏之患畜。
2. 若發生過敏反應,則療程應停止並給予適當的處理。
3. 勿使用於耳膜破裂之患畜。
勿與會造成耳毒性之藥物併用。

注意事項

1. 儲藏方式:常溫保存。
2. 此動物用藥品不需特別的儲藏方式。
若超過標示之有效日期,請勿使用。

本藥品由飼主、畜禽水產養殖業者或飼料廠依獸醫師(佐)處方使用

包裝規格

10 ml (產品批號、製造日期及有效日期請見外盒與瓶身標示)



耳永通

EarTon

- 特殊成分配方,吸收快速,增加局部抗發炎效果!
- 一天一次,輕鬆使用無負擔!



- 寵物專用外耳炎用藥
- 針對細菌性、黴菌性感染治療

10 ml




毛孩有反覆外耳炎的困擾嗎？

反覆外耳炎不該被視為單一症狀，而是潛在疾病的其中一種臨床表現。

常見的原因包括過敏性皮膚炎、異位性皮膚炎，其他如品種造成之耳道先天結構異常、外寄生蟲等都有可能。


耳朵健康檢核表

- ✗ 常常甩頭
- ✗ 不正常發紅
- ✗ 常常抓耳朵
- ✗ 臭臭、耳垢多



狗狗的耳朵構造

- 耳道由開口處進入垂直耳道後再進入水平耳道
- 耳垢易堆積在水平耳道深處不易清潔，造成反覆發炎感染



定期清洗耳朵及適當搭配藥物，
才能夠有效阻止外耳炎的反覆復發！



洗耳液與耳藥使用時機大不同！

	市售洗耳液	耳永通
功能	水狀液劑，幫助改善耳道PH值、清潔耳垢	治療細菌、黴菌性感染外耳炎
使用時機	外耳道耳垢清洗	治療及控制感染
使用頻率	1-2次/週	1次/天，連續使用5天
使用方式	根據耳垢狀況調整清洗次數	將耳道清洗乾淨乾燥後給予
注意事項	千萬不可使用棉花棒 摳挖毛孩耳道！ 以免皮膚受傷發炎惡化！	鼓膜破裂狗狗不可使用， 根據獸醫師建議使用喔！

如何使用耳永通？

- 耳永通為含有抗發炎、抗微生物等藥物成分之寵物專用外耳炎藥品，根據獸醫師指示使用。
- 使用耳永通前先將患部過多之耳毛清除、並清潔耳道、保持乾淨乾燥，使藥物能夠有效被吸收。
- 將延伸套管伸入耳道，給予每隻患耳1劑量(1ml)，1次性的按壓瓶身(按壓約3-5秒)即可給予1劑量。
- 給予藥劑後，應短暫輕柔按摩耳根部，使藥劑能滲入耳道之較低部位
- 耳永通使用劑量為每天1次，每隻患耳給予本劑1ml，連續施予5天。

耳永通

Earton

【成份】Each mL contains Hydrocortisone aceponate (HCA)..... 1.11 mg
Miconazole as nitrate..... 15.1 mg
Gentamicin as sulphate..... 1,505 IU

【適應症】

犬 - 治療急性外耳炎和對慶大黴素(gentamicin)敏感之細菌性及對咪康唑(miconazole)敏感之黴菌性急性惡化性重複性外耳炎;尤其是皮膚芽胞菌(*Malassezia pachydermatis*)。

【用法用量】

犬 - 使用於耳道。

每ml含1.11 mg Hydrocortisone aceponate、15.1mg Miconazole as nitrate和1,505 IU Gentamicin as sulphate。建議於使用前,先將患部過多之耳毛清除並清潔耳道,再使之乾燥。第1次按壓給予前,請先充分搖晃瓶身。建議劑量為每天1次,每隻患耳給予本劑1ml,連續施予5天。將延伸套管深入耳道,給予每隻患耳1劑量(1ml)。1次性的按壓瓶身(按壓約3-5秒)即可給予1劑量。

正確使用方式:

給予藥劑後,應短暫輕柔按摩耳根部,使藥劑能滲入耳道之較低部位。本劑可供犬隻治療雙側性耳炎。本動物用藥品應於常溫下使用(無需冷藏本劑)。

【禁忌】

請勿使用於對主成份或賦形劑、皮質類固醇、唑類(azole)抗黴菌劑、胺基配醣體類(aminoglycosides)藥物過敏之患畜。若發生過敏反應,則療程應停止並給予適當的處理。勿使用於耳膜破裂之患畜。勿與會造成耳毒性之藥物併用。

【不良反應】

可見輕至中度之皮膚發紅(2.4%病例)。很少造成丘疹(少於1%病例)。大多數使用本動物用藥品治療,而呈現不良反應之病例,並不需中斷使用;且所有的犬隻於恢復時,也不需其它特別治療。使用耳劑可能會影響聽力,但通常為暫時性地;且一般發生於老年犬。如遇任何不適或其它仿單內未提及之藥物反應,請告知獸醫師。

【警告事項】

細菌性和黴菌性耳炎常為繼發性,應施予適當的臨床診察以確定其病因。使用本劑應基於病因確診和敏感性試驗之結果,以遵守抗生素使用之原則。對懷孕和泌乳母犬之藥物安全性尚未建立。在建議劑量的使用下,患犬所吸收之HCA、咪康唑和慶大黴素非常微量,不太可能造成致畸胎性(teratogenic),或對母畜和胎畜產生毒性反應。請謹遵獸醫師依醫療風險效益評估所做之指示用藥。與耳道清潔劑之相容性尚未建立。

飼主使用此藥品之注意事項:若不慎碰觸皮膚,建議以大量清水沖洗。請避免碰觸眼睛。若不慎接觸眼睛,以大量清水沖洗。若眼睛受傷,請速就醫。若不慎誤食,請攜帶仿單或標籤,立即就醫。

【注意事項】

1. 儲藏方式:勿置於孩童可目視和接觸之處。
2. 此動物用藥品不需特別的儲藏方式。若超過標示之有效日期,請勿使用。
3. 丟棄剩餘產品或廢棄物之注意事項:請詢問獸醫師如何丟棄不再使用之藥劑。此注意事項有助於保護環境。
4. 此動物用藥品合併3種有效物質:抗生素、抗黴菌劑和類固醇。

本藥品由飼主、畜禽水產養殖業者或飼料廠依獸醫師(佐)處方使用。

【包裝規格】10、20、50、100毫升瓶裝

產品批號、製造日期及有效日期請見外盒與瓶身標示

本製造廠通過台灣檢驗科技股份有限公司(SGS Taiwan Ltd.) ISO 9001認證

Vetnstrum

永鴻國際生技股份有限公司

VETNOSTRUM ANIMAL HEALTH CO., LTD.

台北市松山區民權東路三段181號12樓 | 02-2718-6200

新竹廠:新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號

產品編號:407519010(OML)

217517341



通

物

用

外

用

液

劑