

PCI

動物藥製字 第07036號

動物用注射劑 (滅菌懸劑)

“永鴻”青黴素懸濁注射液

Pencillin Injection

青黴素為多種系屬之青黴菌(Penicillium notatum)及青黴金繩屬(P. chrysogenum)發育時所產生之一種抗生素，最常應用者為青黴素G。本藥則為青黴素G加上普魯卡因(Procaine)所製成，Procaine可以使原為溶解度較高的青黴素G變為溶解度較低的製劑型態，以便徐徐放出青黴素，而延長青黴素的治療效果。

【成份】每毫升(mL)含有 Penicillin G Procaine 300,000 I.U.

【特點】

1. 本藥療效持續時間長，一次注射可維持24小時以上有效血中濃度。
2. 本藥能干擾細菌發育時核糖核酸的合成，阻礙革蘭氏陽性菌的蛋白同化作用，而達到殺菌之目的。
3. 本藥為水性懸濁注射液，藥效安定，使用方便，且這種極微粒化之顆粒只要輕輕振搖，即可均勻分布，易於抽取及注射。

【適應症】

牛：治療肺炎、子宮內膜炎、乳房炎。
豬：治療丹毒。
馬：治療腺疫、破傷風。
犬：治療鉤端螺旋體病。

【用法用量】

肌肉注射
牛、馬：每公斤體重 6,000-12,000 I.U. (0.02-0.04mL)
豬：每公斤體重 7,500-15,000 I.U. (0.025-0.05mL)
羊、小馬、小牛：每公斤體重 20,000-40,000 I.U. (0.067-0.133mL)
狗：每公斤體重 30,000-200,000 I.U. (0.1-0.67mL)
依症狀增減，每日一次施行肌肉深部注射。

【注意事項】

1. 停藥期七天。
2. 本藥不可與磺胺藥混合使用。
3. 本藥不可施靜脈注射。
4. 若發生青黴素過敏反應，應立即停止注射。
5. 本藥灌注乳房後96小時內所產之奶不可飲用。
6. 使用前須振搖均勻。
7. 於25°C以下儲存。

本處方藥品限由執業獸醫師(佐)監督之下使用

【包裝規格】20, 50, 100, 500毫升瓶裝

產品批號、製造日期及有效日期請見瓶身標示

本製造廠通過台灣檢驗科技股份有限公司(SGS Taiwan Ltd.) ISO 9001認證



永鴻國際生技股份有限公司
VETNOSTRUM ANIMAL HEALTH CO., LTD.
新竹廠：新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號
產品編號：432006010 217515343

