RHI
動物藥製字 第08334號

動物用注射劑 (注射劑)

依定生®

Regubirth® Injection

本劑屬於前列腺素$F_2\alpha$(Prostaglandin $F_2\alpha$簡稱$PGF_2\alpha$)之一，其作用即使子宮平滑肌和輸卵管發生痙攣性收縮及蠕動異常，並壓縮子宮卵巢動脈，阻斷了黃體的血液，使黃體細胞呈飢餓狀態，而達到溶解黃體作用，助孕酮濃度也會急速下降，同時增強雌激素作用，使子宮腔內環境不利於著床，所以對懷孕早期能導致流產，對懷孕末期能運用為誘導生產。

現代化經營豬場如欲實施批次生產管理，改善種母豬生產力、增加年生產、出售及屠宰之豬隻頭數，在技術上，本劑可提供豬場針對有下列情況之母豬群施行注射：一、有永久黃體不再發情母豬，使黃體溶解，以期恢復發情週期再配種生產。二、懷孕種母豬適時著手定期分娩，提昇生產工作效率。

【成 份】每毫升(mL)中含有：
Cloprostenol Sodium ..... 92μg(相當Cloprostenol 87.5μg)

【特 點】

1. 本劑用於定期分娩，有助豬場做批次生產計劃，整群統進統出懷孕分娩母豬及仔豬，以便加強衛生管理，提昇生產工作效率。
2. 使分娩及人員工作調度安排更為方便，避免母豬於週末、假期及晚上分娩。
3. 預防母豬及新母豬之逾期分娩，改善有永久黃體不發情母豬群，以期恢復發情週期再配種加入生產。
4. 便利在同一區域畜舍、同時段分娩、集體管理與照顧，剛出生仔豬窩數大小調整交互哺育，使分娩舍及器具設備發揮最大之利用效果。

【適應症】

母豬：具有黃體分解作用，並興奮子宮肌肉之活動力，誘導懷孕母豬流產或做定期自然分娩。

【用法用量】

1. 該母豬配合管理上需要使用本劑之前，其應具備有完整的配種日期，依照豬隻懷孕期111～119日（平均115日）計算出預定分娩日，在預定分娩前2日或適當特定管理上需要之日期，注射本劑做定期誘導分娩。約有95%懷孕母豬，注射本劑後36小時內即可完成分娩（除了即將自然分娩者例外，大部份的均在注射本劑後24±5小時內分娩完畢)。
2. 每頭母豬使用劑量為2mL，以肌肉深部注射（最好使用4公分長的注射針頭）。

【注意事項】

1. 於25℃以下、避光儲存。
2. 請在有效期限內使用。
3. 本劑專供母豬使用，注射本劑24小時內之母豬，請勿屠宰供人食用。
4. 未能在預定分娩前或太早注射本劑，將使分娩之小豬早產無法育成，即在平均分娩前3日(含)以注射時，可能增加不能有育成之仔豬數。
5. 本劑可經由皮膚吸收，具有生育年齡、懷孕婦女及氣喘病患者避免接觸，因意外濺及皮膚時，應立刻用清水洗乾淨。
6. $PGF_2\alpha$型之前列腺素可能引起人之支氣管痙攣，若因意外吸入或注射本劑引致呼吸困難時，應使用速效型之支氣管擴張劑如Isoprenaline或Salbutamol治療之。

本處方藥品限由執業獸醫師(佐)使用

【本產品適應症、建議使用方式、禁忌症、警語、儲存條件及相關注意事項，請詳閱仿單內容】

【包裝規格】20、50、100毫升瓶裝

產品批號、製造日期及有效日期請見瓶身標示

本製造廠通過台灣檢驗科技股份有限公司(SGS Taiwan Ltd.) ISO 9001認證

Vetnostrum

永鴻國際生技股份有限公司
VETNOSTRUM ANIMAL HEALTH CO., LTD.
新竹廠：新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號
產品編號：431025020 217516444