

SCI  
動物藥製字 第05481號

動物用注射劑 (滅菌懸劑)

# 信可得® 懸濁注射液

## Shincort® Injection

腎上腺皮質固醇之主要作用為維持體內代謝平衡和調節體液之合成，以及維持各種細胞之代謝，併有消炎、抗過敏、止癢的作用，本藥Triamcinolone acetonide記載於英國藥典屬於Glucocorticoid類的腎上腺皮質固醇。

本藥其作用比Prednisolone強，持續作用時間也長，抗炎和抗過敏作用都比一般可體松(Cortisone)效果好，本藥雖然和一般可體松作用原理一樣，但本藥只要極低之濃度就可發揮優良的消炎、抗過敏作用。

非病原體引起的炎症、血糖過少症(酮血症)、癢覺等，單獨使用本藥可獲得完全的療效，若是由病原(病毒、細菌等)引起的疾病，除使用本藥治療以消除腫脹、疼痛之症狀外，必須配合上化學療法才能達到完全的療效。

【成份】每毫升(mL)中含有：Triamcinolone acetonide ..... 2mg

### 【特點】

1. 本藥的消炎、抗過敏作用比一般可體松作用強，作用持續時間也長，對急性關節炎、急性乳房炎之效果很好。
2. 本藥係屬於Glucocorticoid類腎上腺皮質固醇，故對家畜的酮血症效果極佳。
3. 本藥用於傳染病時，須加以其他的化學療法。

### 【適應症】

牛、馬、犬、貓：治療關節炎、酮血症、灼傷、皮膚炎、癢覺、肺炎、支氣管炎。

### 【用法用量】

- 牛：2.5-10mg 肌肉注射；酮血症須要間隔二天後再注射一次。  
馬：10-20mg 肌肉注射。  
6-18mg 關節囊內注射。  
犬、貓：0.1mg/磅 (0.22mg/公斤) 肌肉注射，必要時間隔 7~10天後，再注射一次。  
1-2mg關節內注射。

### 【注意事項】

1. 停藥期：7天。
2. 於25°C以下儲存。
3. 為避免因藥品沈澱結塊，影響藥液抽離，儲存期間請勿倒立。
4. 請在有效期限內使用。

本處方藥品限由執業獸醫師(佐)監督之下使用

本產品適應症、建議使用方式、禁忌症、警語、儲存條件及相關注意事項，請詳閱仿單內容

【包裝規格】20、50、100 毫升瓶裝

產品批號、製造日期及有效日期請見瓶身標示

本製造廠通過台灣檢驗科技股份有限公司(SGS Taiwan Ltd.) ISO 9001認證

vetnostrum

永鴻國際生技股份有限公司  
VETNOSTRUM ANIMAL HEALTH CO., LTD.  
台北市松山區民權東路三段181號12樓 | 02-2718-6200  
新竹廠：新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號  
產品編號：431002010 217513742

