

TPI
動物藥製字 第08310號

動物用注射劑 (滅菌懸劑)

帝保® 長效針

TICKPAO® L.A. Injection

本藥係由三種廣效性抗生素，以適當混合比例而製成，即是青黴素 G (Penicillin G Procaine)、卞乙二胺青黴素 (Penicillin G Benzathine) 以及二氫鏈黴素 (Dihydrostreptomycin Sulfate) 組合而成之注射劑，且因容易吸收，而迅速達到極高之治療血中濃度，高效迅速達到組織病灶，持續防止疾病復發與再感染。本藥對大部分的革蘭氏陽性和陰性細菌皆有優秀的抗殺菌效力。

【成份】每毫升(mL)含有 Penicillin G Procaine 100,000 I.U. (potency)
Penicillin G Benzathine 100,000 I.U. (potency)
Dihydrostreptomycin Sulfate 250mg (potency)

【特點】

1. 本藥因併用三種廣效性抗生素，形成相加相乘之協同作用，故殆無耐性菌之發生。
2. 本藥抗菌範圍廣泛，對絕大多數的革蘭氏陽性及陰性細菌混合感染症，如肺炎、肺疫、腸炎、下痢、丹毒、化膿症、乳房炎、中耳炎、子宮內膜炎、心內膜炎、關節炎、產褥熱、運輸熱、火傷、腺疫、尿道感染症、破傷風、炭疽菌症、放線菌症、鉤端螺旋體症均具有優越的制菌殺菌之治療效果。
3. 本藥一次肌肉注射，即具有持續而長之藥效，提供快速確實治療。
4. 毒性低、安全性高，殆無副作用。

【適應症】

牛、馬、羊、豬：治療革蘭氏陽性、陰性細菌引起之感染症。

【用法用量】

以每頭動物計算行肌肉注射，使用本藥劑量如下：

1. 牛、馬：20~35mL。
2. 仔牛、羊：6~15mL。
3. 母豬：3~7mL。
4. 仔豬：0.5~5mL。

【注意事項】

1. 停藥期：30天，乳牛14天。
2. 本藥不可連續使用7天以上。
3. 請於2~8°C冷藏。

本處方藥品限由執業獸醫師(佐)監督之下使用

【包裝規格】100毫升瓶裝

產品批號、製造日期及有效日期請見瓶身標示

本製造廠通過台灣檢驗科技股份有限公司(SGS Taiwan Ltd.) ISO 9001認證



永鴻國際生技股份有限公司

VETNOSTRUM ANIMAL HEALTH CO., LTD.

台北市松山區民權東路三段181號12樓 | 02-2718-6200

新竹廠：新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號

產品編號：432005010

217515242

