

飲水用允旺[®]，下痢不來亂



Colistin 12%

允旺[®] 12%




產品特點

效果確實，殺滅病源→口服後作用於腸道

飲水投予，快速殺菌→針對革蘭氏陰性菌

下痢問題，輕鬆搞定→可合併其他藥物使用

Colistin 作用在革蘭氏陰性菌的細胞外膜 改變外膜結構！



Colistin 部分結構攜帶正電，

改變外膜上鈣離子與鎂離子的結構

- 方便藥物分子穿透細胞膜

Colistin 破壞細胞外膜結構穩定性

- 導致細胞質內膜裂解、細胞質外滲
- 細菌凋亡 (殺滅細菌)

允旺® 12% 有效處理畜禽常見消化道問題！



雞白痢
Salmonella pullorum



大腸桿菌
avian pathogenic *E. coli*



大腸桿菌
E. coli



沙門氏菌
Salmonella spp.



現場 Colistin 預防與治療劑量：

預防 - 1公斤 (120ppm)；治療 - 2公斤 (240ppm)

可與其他廣效性抗生素合併使用，加強抗菌力

允旺® 12% Winone® 12%

1kg

成分	Each g contains : Colistin sulfate 120mg (相當於360萬IU)
適應症	豬、小牛 (3個月齡以下)、肉雞、火雞及產蛋雞： 治療對Colistin sulfate具感受性之大腸桿菌或沙氏桿菌引起之消化道感染。
用法用量	本劑溶於飲水中，立即給予，連續5-7天。 豬、小牛 (3個月齡以下)：每日每公斤體重給予本劑42-50mg 肉雞、火雞及產蛋雞：每日每公斤體重給予本劑50mg
停藥期	3天
注意事項	<ul style="list-style-type: none">勿使用於反芻動物。本劑與Polymyxin有拮抗作用，腎臟功能嚴重者勿用。

