

安莫西林 系列


Amoxicillin Powder
20% & 50%

動物藥製字
第07520號
第07577號

安莫西林散主成分 Amoxicillin 為一種半合成的廣效 Penicillin 製劑，對於革蘭氏陽性菌及陰性菌均有強力的殺菌作用。

安莫西林 對細菌之作用機制

- 吸收快
- 毒性低
- 性質安定



品質穩定 效果確實

從原料控管到製造流程，皆來自歐盟專利工藝，歷經超過40種檢驗程序，精心打造確保安莫西林成分的穩定性、藥物濃度及密度、甚至顆粒粒徑(大小均勻)，使產品在水中迅速崩解，釋放100%藥效。

永鴻 安莫西林系列 於不同條件下之穩定性試驗


| 產品 | 安莫西林 20% AXP2 | 安莫西林 50% AXP5 |
|------------|------------------|------------------|
| 檢測項目 | | |
| 室溫 | 99.4 % | 102.0 % |
| pH 4.0 | 100.8 % | 103.8 % |
| pH 7.0 | 100.7 % | 104.2 % |
| 25 °C、15天 | 97.6 % | 104.0 % |
| 40 °C、15天 | 94.0 % | 97.8 % |
| 80 °C、30分鐘 | 97.4 % | 101.4 % |
| 80 °C、60分鐘 | 96.3 % | 99.1 % |

安莫西林 系列

Amoxicillin Powder

20% & 50%

適應症



造粒製程
不易揚塵

自來水及硬水中溶解迅速
不沉澱、不卡管

藥效廣泛
作用確實

規格與成分

安莫西林 20% (AXP2) 每克中含有 Amoxicillin trihydrate 200mg(Potency)

安莫西林 50% (AXP5) 每克中含有 Amoxicillin trihydrate 500mg(Potency)

| 物種 | 雞(不含產蛋中之蛋雞) | | 豬 | |
|------|--|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | 20% | 50% | 20% | 50% |
| 規格 | 20% | 50% | 20% | 50% |
| 停藥期 | 5天 | 7天 | 15天 | |
| 用法用量 | 本藥100克泡於400公升水中飲用，連續使用2-3天。 | 本藥100克泡於1噸水中飲用，連續使用2-3天。 | 每公斤體重使用50mg，一天兩次，連續使用3-5天泡於水中飲用或直接灌食。 | 每公斤體重使用20mg，一天兩次，連續使用3-5天泡於水中飲用或直接灌食。 |
| 適應症 | 大腸桿菌症、沙門氏菌症、傳染性鼻炎及細菌性下痢 | | 大腸桿菌症、沙門氏菌症、嗜血桿菌症、巴氏桿菌症、萎縮性鼻炎、豬丹毒、腦膜炎 | |
| 注意事項 | <ul style="list-style-type: none">雞16週齡以上與產蛋中之蛋雞不得使用。至少持續使用48小時直至症狀消失；請勿連續使用超過7天。 | | | |

