

快治樂®

DAINICOL®
POWDER

FLORFENICOL 治療用散劑



豬呼吸道 綜合症剋星

安全

改良的化學結構
使用安全

強效

結構中加入氟元素
有效提升抗菌效果

分布 廣泛

脂溶性高
組織分布迅速

廣效

能對抗黴漿菌和多種革蘭氏陽、
陰性菌
對**豬呼吸道病原菌**有顯著效果



快治樂®是呼吸道綜合症（PRDC）爆發時， 飼料添加的首選藥品，有效對抗呼吸道病原菌！

依瑞典及西班牙抗藥性試驗測試結果顯示：
FLORFENICOL 對於呼吸道病原菌仍有良好的抵抗效果。

抗 生 素	呼 吸 病 原 菌		抗 菌 比 例 (%)
快治樂® FLORFENICOL	2017 – 2019 (瑞典)	豬放線桿菌 <i>A. pleuropneumoniae</i>	97%
		巴氏桿菌 <i>P. multocida</i>	100%
	2004 – 2017 (西班牙)	豬放線桿菌 <i>A. pleuropneumoniae</i>	100%
		博德氏菌 <i>B. bronchiseptica</i>	98.3%

Anna Vilaró (2020)
Holmer et al. BMC Veterinary Research (2019)

適應症

豬放線桿菌 胸膜肺炎 <i>A. pleuropneumoniae</i>	副豬嗜血桿菌 <i>H. Parasuis</i>	巴氏桿菌 <i>P. multocida</i>	博德氏菌 <i>B. bronchiseptica</i>	水禽雷氏桿菌 <i>Riemerella anatipestifer</i>
				
高燒 耳翼發紺 張口呼吸 死後流鼻血	多發性漿膜炎 腹式呼吸 高燒 關節腫大	打噴嚏 鼻吻部變形 肺臟膿瘍 胸膜炎	打噴嚏 鼻炎 支氣管炎 肺炎	精神沉鬱 眼鼻分泌物增加 打噴嚏

	快治樂® 10%P Dainicol® 10% Powder		快治樂® 2%P Dainicol® 2% Powder	
成分	每公斤含有 Florfenicol 100g		每公斤含有 Florfenicol 20g	
適應動物	豬	土番鴨 (不含產蛋中之蛋鴨)	豬	土番鴨 (不含產蛋中之蛋鴨)
用法用量	每噸飼料添加0.2-0.4公斤， 或每公斤體重投予本劑 0.01-0.02公克。	每公斤體重投予 本劑0.4公克，每天1次， 連續投予5天。	每噸飼料添加本產品1-2公斤， 或每公斤體重投予本產品 50-100毫克。	每公斤體重投予相當於 氟甲磺氯黴素40毫克之量， 每天1次，連續使用5天。
停藥期	3 天	14 天	3 天	14 天
包裝規格	20公斤/包		25公斤/包	
注意事項	1. 請勿連續使用超過7天。 2. 本藥品由飼主、畜禽水產養殖業者或飼料廠依獸醫師(佐)處方使用。			