



TEVETSIN - F

金威讚® -F

Tylvalosin Tartrate 5%

真正威猛殺菌讚

- 抗菌效果快速且廣泛
- 活化免疫系統
- 降低發炎反應

動物藥製字
第09598號

金威讚®-F 抑菌抗病 效果威猛殺菌讚

● 抗菌效果快速且廣泛

Tylvalosin 之抗菌範圍


- ① 對家禽及豬的黴漿菌有很強的抗菌活性。
- ② 革蘭氏陽性菌 (如金黃色葡萄球菌、化膿性鏈球菌等)
- ③ 對革蘭氏陰性菌也具有抗菌活性。

口服後，藥物迅速吸收，30分鐘後達到血中最高濃度。

Tylvalosin 及其代謝產物分佈全身，主要組織器官的藥物濃度高於血中濃度。

● 活化免疫系統及降低發炎反應

Tylvalosin 可活化巨噬細胞並聚集至溶小體內，隨著巨噬細胞到感染區域，協助殺滅病原菌。



Tylvalosin 具有免疫調節作用，調節炎症反應，降低病變嚴重程度。

適應症




慢性呼吸道疾病 (MG)
Mycoplasma gallisepticum

好發年齡：肉雞(4-8週)與火雞
臨床症狀：流鼻涕、濕性囉音、氣囊炎；火雞
眼窩下竇腫脹；蛋雞產蛋率下降。



傳染性滑膜炎 (MS)
Mycoplasma synoviae

好發年齡：肉雞與火雞(10-12週)
臨床症狀：雞冠蒼白、跛足，生長遲緩、腳弱
消瘦，踝關節與趾關節明顯腫脹。



肺炎黴漿菌
Mycoplasma hyopneumoniae

好發年齡：六週齡至上市年齡(特別是2-4月齡)
臨床症狀：持續性乾咳和呼吸困難，容易繼發
其他病原感染。



鼻炎黴漿菌
Mycoplasma hyorhinis

好發年齡：通常在3-10週齡
臨床症狀：體溫升高，跛行，食慾不振，關節腫
脹，呼吸困難，呈現臥臥姿勢。



豬關節滑膜炎黴漿菌
Mycoplasma hyosynoviae

好發年齡：12-24週齡
臨床症狀：跛足，站立困難，偶有跪姿，關節腫
大。腫脹的關節囊腔內有漿液纖維蛋白滲出液。

金威讚®-F TEVETSIN-F

成分 每公斤含有 Acetylisovaleryltylosin tartrate 50GM(POT.)

用法用量

疾病	飼料添加量	有效濃度	治療期間
預防	1kg/噸	50ppm	5-7天
治療	1.5-2kg/噸	75-100ppm	5-10天

藥物搭配建議組合

黴漿菌與細菌感染時	金威讚-F 1-1.5kg + 歐羅肥 15.4 3.6kg
PRRS混合其他感染時	金威讚-F 1-1.5kg + 金順 2kg

包裝規格 20公斤

注意事項

- ① 本藥品由飼主、畜禽水產養殖業者或飼料廠依獸醫師處方使用
- ② 停藥期：豬 3 日，雞 5 日
- ③ 請儲存於陰涼乾燥處
- ④ 蛋雞不得使用

金威讚®-F 添加於飼料中使用