

金威讚®

TEVETSIN | Tylvalosin Tartrate 5%

真正威猛殺菌讚

- 抗菌效果快速且廣泛
- 活化免疫系統
- 降低發炎反應

動物藥製字
第09334號

· 抗菌效果快速且廣泛

金威讚成分為Acetylisovaleryltylosin tartrate(同tylvalosin)，為巨環類抗生素，為濃度依賴型抗生素，對於生長緩慢的病原菌可有效殺滅。


金威讚之抗菌範圍

- ① 微漿菌，特別是肺炎微漿菌和鼻炎微漿菌均有很強的抗菌活性。
- ② 革蘭陽性菌(如金黃色葡萄球菌、化膿性鏈球菌、放射桿菌胸膜肺炎、化膿性棒狀桿菌等)
- ③ 革蘭陰性菌具有強抗菌活性。

口服後，藥物迅速吸收，30分鐘後達到血中最高濃度。金威讚及其代謝產物分佈全身，主要組織器官的藥物濃度高於血中濃度。


· 活化免疫系統及降低發炎反應

金威讚對免疫系統有直/間接的作用，促使單核細胞轉化巨噬細胞，活化巨噬細胞並聚集溶酶體內。快速趨化到感染區域，殺滅病原菌。



金威讚和溶酶體的組合助於非特異性免疫抵抗病原菌。可減輕病原菌引發的炎症反應，降低病變的嚴重程度。

適應症



肺炎微漿菌
Mycoplasma hyopneumoniae

好發年齡：六週齡至上市年齡(特別是2-4月齡)

臨床症狀：持續性乾咳和呼吸困難，容易繼發其他病原感染。



慢性呼吸道疾病 (MG)
Mycoplasma gallisepticum

好發年齡：肉雞(4-8週)與火雞

臨床症狀：流鼻涕、濕性囉音、氣囊炎；火雞眼窩下實腫脹；蛋雞產蛋率下降。



鼻炎微漿菌
Mycoplasma hyorhinis

好發年齡：通常在3-10週齡

臨床症狀：體溫升高，跛行，食慾不振，關節腫脹，呼吸困難，呈現臥臥姿勢。



傳染性滑膜炎 (MS)
Mycoplasma synoviae

好發年齡：肉雞與火雞(10-12週)

臨床症狀：雞冠蒼白、跛足，生長遲緩、腳弱消瘦，踝關節與趾關節明顯腫脹。



豬關節滑膜微漿菌
Mycoplasma hyosynoviae

好發年齡：12-24週齡

臨床症狀：跛足，站立困難，偶有跪姿，關節腫大。腫脹的關節囊腔內有漿液纖維蛋白滲出液。

用法用量 每噸飼料添加0.4 - 1.0公斤，視病情連續使用5-7天。

家禽

疾病	治療期間	治療劑量
微漿菌症	出生後0-7天	1-2kg
壓力期 (氣候變化或疫苗接種期間)	5-7天	1-2kg

豬

疾病	治療期間	治療劑量
一般預防	21天	1kg
急性爆發時	21-28天	2-4kg
微漿菌肺炎/鼻炎微漿菌	21-28天	1-2kg
增生性迴腸炎	10-21天	1-2kg

● 建議可同時與 泰好用® 搭配，適當調整劑量！

金威讚®

包裝規格 - 1公斤

成分 每公斤含有 Acetylisovaleryltylosin tartrate 50GM(POT.)

注意事項

- ① 本藥品由飼主、畜禽水產養殖業者或飼料廠依獸醫師處方使用
- ② 停藥期：豬 3 日，雞 5 日
- ③ 請儲存於陰涼乾燥處
- ④ 蛋雞不得使用