




TYLOSIN
PHOSPHATE
25%



泰駱素 250

Tailocin 250

肥育後期安心用
準時上市免煩惱



Tylosin 抗菌範圍



豬 - 對於**增生性腸炎**、豬赤痢、黴漿菌、具敏感性革蘭氏陽性菌及少數革蘭氏陰性菌有效




胞內勞森氏菌 (增生性腸炎) *Lawsonia intracellularis*

急性：迴腸出血，血便、厭食、突然死亡

慢性：持續水樣下痢，換肉率低



雞 - 對於**黴漿菌**、**梭菌**具敏感性革蘭氏陽性菌及少數革蘭氏陰性菌有效



敗血性雞黴漿菌 *Mycoplasma gallisepticum*

慢性呼吸道病(CRD)、氣囊炎、鼻竇炎、結膜炎及產蛋下降



滑液囊黴漿菌 *Mycoplasma synoviae*

上呼吸道感染症、滑膜炎、蛋尖異常症候群、產蛋下降



家禽壞死性腸炎 Necrotic Enteritis(NE)

球蟲症及產氣莢膜梭菌混和感染

TYLOSIN
PHOSPHATE
25%

泰駱素 250 Tailocin 250

20 kg (包)

成分含量 每公斤含有泰黴素(Tylosin phosphate) 250公克 (250,000,000 IU) (POT.)

適應症 豬：治療及控制由 *Lawsonia intracellularis* 細菌引起之增生性腸炎
雞(肉雞、新母雞)：治療及控制由 *Mycoplasma gallisepticum* 及 *Mycoplasma synoviae* 引起之呼吸道感染

用法用量 豬 - 治療增生性腸炎(PIA)：每公斤飼料添加本品320 - 400 mg，持續3週
雞(肉雞、新母雞) -
治療黴漿菌感染之呼吸道疾病：每公斤飼料添加本品4400 mg，持續5天
治療壞死性腸炎：每公斤飼料添加本品350 - 700 mg，持續7天

停藥期 豬：肉、內臟：0天 雞：肉、內臟：1天 (勿使用於產蛋中之產蛋雞)

注意事項 本藥品由飼主、禽畜水產養殖業者或飼料廠依獸醫師處方使用
請貯藏於室內乾燥涼爽處
開封後請盡速使用完畢，未使用完請密封保存